

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom de la mère : _____

**PUC DU GENOU, PTG ET PTH
ORDONNANCE DE CONGE**

Poids : _____ kg Taille : _____ cm

Allergies : _____ Clairance créatinine : _____ mL/min

Type de chirurgie : ☐ Prothèse unicompartimentale (PUC) du genou ☐ Prothèse totale de la hanche (PTH) ☐ Prothèse totale du genou (PTG)		Cette ordonnance est non renouvelable	
Rivaroxaban 10 mg PO DIE à débiter le lendemain de la chirurgie Initiales ☐ PUC du genou / PTG pour 14 jours au total <i>Code d'exception RAMQ : CV126</i> ☐ PTH pour 35 jours au total <i>Code d'exception RAMQ : CV127</i>		Fragile = échelle de fragilité de 4 et plus (voir AMC-DSIEU-6167)	
Si contre-indication au rivaroxaban, autre anticoagulant : _____			
DimenhyDRINATE 50 mg PO q 4 à 6 h PRN (éviter si usager de 75 ans et plus ET/OU fragile) Initiales		Qté : 12 comprimés	
Ondansétron 4 mg PO q 8 h PRN (privilégier si usager de 75 ans et plus ET/OU fragile) Initiales		Qté : 10 comprimés	
Non couvert par la RAMQ			
Acétaminophène 1000 mg PO QID x 7 jours puis q 6 h PRN ensuite (max : 4 g par jour) Initiales		Qté : 120 comprimés	
Célécoxib* 100 mg PO BID x 30 jours Initiales		Qté : 60 capsules	
OU Suggéré si usager de 75 ans et plus ET/OU fragile Célécoxib* 100 mg PO BID x 7 jours puis 100 mg BID PRN pour 21 jours * ATTENTION : ÉVITER chez usager à risque (maladie cardiovasculaire, insuffisance cardiaque ou rénale)		Qté : 35 capsules	
Pantoprazole 40 mg PO DIE lorsque l'usager reçoit le célécoxib et nécessite une prophylaxie cytoprotectrice (code d'exception RAMQ : PP12) Initiales		Qté : 30 comprimés	
Tramadol 50 mg 2 co PO q 6 h PRN Initiales		Qté totale : 80 comprimés, servir 40 comprimés à la fois OU Qté totale : ____ comprimés, servir ____ comprimés à la fois	
Non couvert par la RAMQ OU Suggéré si usager de 75 ans et plus ET/OU fragile ou Clcr inférieure ou égale à 30 mL/min Tramadol 50 mg 1 co PO q 12 h PRN Initiales		Qté totale : 40 comprimés, servir 20 comprimés à la fois OU Qté totale : ____ comprimés, servir ____ comprimés à la fois	
Non couvert par la RAMQ Oxycodone 5 mg 1 ½ co PO q 4 h PRN Initiales		Qté totale : 80 comprimés, servir 40 comprimés à la fois OU Qté totale : ____ comprimés, servir ____ comprimés à la fois	
OU Suggéré si usager de 75 ans et plus ET/OU fragile ou Clcr inférieure ou égale à 30 mL/min Oxycodone 5 mg 1 co PO q 4 h PRN		Qté totale : 40 comprimés, servir 20 comprimés à la fois OU Qté totale : ____ comprimés, servir ____ comprimés à la fois	
Polyéthylène glycol (PEG 3350) 17 g PO DIE ☐ Régulier ☐ PRN si constipation Initiales		Qté : ☐ 119 g ☐ 238 g ☐ boîte 10 sachets	
Code d'exception RAMQ GI 28			

Nom du pharmacien : _____ Télécopieur : _____

Cette ordonnance est l'originale. Le pharmacien identifié est le seul destinataire. Le document original ne sera pas réutilisé.

Date et heure (aaaa/mm/jj)	Signature du prescripteur	# permis
☐ Envoyé par _____ (init.)	Heure d'envoi : _____	Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)

	1	Très en forme Des personnes robustes, actives, énergiques et motivées. Elles font généralement de l'activité physique régulièrement et comptent parmi les personnes les plus en forme pour leur âge.
	2	En forme Ces personnes n'ont pas de symptômes actifs de maladie, mais sont moins en forme que celles de la « catégorie 1 ». Elles font souvent de l'activité physique ou sont très actives occasionnellement, selon la saison.
	3	Se débrouille bien Des personnes dont les problèmes médicaux sont bien maîtrisés, même si elles présentent des symptômes à l'occasion, mais qui ne sont souvent pas régulièrement actives au-delà de la promenade régulière.
	4	Très légèrement fragile Auparavant « vulnérables », cette catégorie représente l'amorce de la perte de l'indépendance complète. Bien que ces personnes ne dépendent pas d'autrui pour une aide au quotidien, des symptômes limitent fréquemment leurs activités. Elles se plaignent souvent d'être « ralenties » ou d'être fatiguées pendant la journée.
	5	Légèrement fragile Des personnes qui présentent un ralentissement évident et qui ont besoin d'aide pour les activités instrumentales complexes de la vie quotidienne (finances, transport, gros travaux ménagers, médicaments). De façon générale, une fragilité légère nuit progressivement à la capacité de faire les courses ou de marcher à l'extérieur seul, de préparer ses repas, de gérer ses médicaments et commence à limiter l'exécution de travaux ménagers légers.
	6	Modérément fragile Des personnes qui ont besoin d'aide pour toutes les activités à l'extérieur et pour tenir maison. À l'intérieur, elles ont souvent de la difficulté dans les escaliers et ont besoin d'aide pour le bain, et peuvent avoir besoin d'une aide minimale (encouragement, présence) pour s'habiller.
	7	Sévèrement fragile Dépendance complète pour les soins personnels, que ce soit pour les causes physique ou cognitive. Malgré tout, ces personnes semblent stables et leur risque de mourir (dans les 6 prochains mois environ) ne semble pas très élevé.
	8	Très sévèrement fragile Dépendance complète pour les soins personnels et approche de la fin de vie. De façon générale, ces personnes ne se remettraient pas d'une maladie même bénigne.
	9	En phase terminale Approchent de la fin de vie. Cette catégorie correspond aux personnes ayant une espérance de vie de < 6 mois, qui ne sont pas par ailleurs gravement fragiles (certaines personnes peuvent encore faire de l'activité physique jusqu'à très près de leur décès.)

SCORE DE FRAGILITÉ DES PERSONNES ATTEINTES DE DÉMENCE

Le degré de fragilité correspond au degré de démence.

Les symptômes courants de démence légère sont l'oubli des détails d'un événement récent sans que l'événement lui-même soit oublié, la répétition d'une même question ou histoire et le retrait social.

Dans le cas de démence modérée, la mémoire à court terme est très altérée, même si les personnes se rappellent bien d'événements de leur passé. Elles ont besoin d'encouragement pour leurs soins personnels.

Dans le cas de démence sévère, les personnes ne peuvent pas s'occuper de leurs soins personnels sans aide.

Dans le cas de démence très sévère, les personnes sont souvent alitées. Bon nombre d'entre elles sont à peu près muettes.

Références : Dalhousie University. (2020). Clinical Frailty Scale. Repéré à : <https://www.dal.ca/sites/gmr/our-tools/clinical-frailty-scale.html>

Direction émettrice :	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Entrée en vigueur :	2025-02-07
AMC-DSIEU-6167 (2025-02)		Révision :	