

CONTENU MATÉRIEL ET TROUSSE DE MÉDICAMENTS D'URGENCE
MILIEU AVEC INFIRMIÈRE OU MÉDECIN

À l'extérieur de la trousse de premiers secours et de la trousse de médicaments	
	Quantité
Sphygmomanomètre portatif standard	1
Brassard adulte moyen	1
Brassard pédiatrique (<i>milieu avec clientèle pédiatrique</i>)	1
Ballon masque adulte à usager unique (<i>Doit être utilisé par du personnel expérimenté</i>)	1
Ballon masque pédiatrique à usager unique (<i>Doit être utilisé par du personnel expérimenté dans un milieu avec clientèle pédiatrique</i>)	1
Lampe de poche à DEL	1
Saturomètre portatif	1
Stéthoscope jetable	1
DEA-défibrillateur cardiaque (<i>si disponible dans le milieu/facultatif</i>)	1
Planche de réanimation (<i>milieu d'hébergement seulement</i>)	1
Cartable incluant la directive (DIR-10378) et l'ensemble des outils cliniques associés	1
	Quantité
Appareil à succion portative 1500mm GOMCO (<i>facultatif</i>)	1
Tube rallonge succion 3/16 X 72PO A/Raccord entonnoir stérile (<i>facultatif</i>)	1
Cathéter à succion 16 FT avec valve Med-RX (<i>facultatif</i>)	1
Ensemble d'oxygène complet (<i>milieu avec hébergement et traitement agoniste aux opioïdes</i>). 1 régulateur d'air 0-15 litres/min 1 cylindre en aluminium de type "D" de 405 litres 1 recharge en oxygène médical 100% 1 sac avec fenêtre en mica ou un chariot de transport 1 clé pour valve de bouteille O₂ 2 masques 100% pour Adulte avec courroie élastique et 7 pieds (2,13 m) de tubulure (à usage unique) 1 lunette avec tubulure (à usage unique de 7 pieds)	1

Trousse de médicaments	
Naloxone (<i>intranasale exclusive aux milieux avec usagers utilisateurs de substance psychoactive</i>)	2 vaporisateurs
Naloxone (Narcan) ampoule de 1 mL contenant 0,4 mg/mL (<i>exclusif aux milieux qui administrent des opioïdes</i>)	1 ampoule
DiphenhydramINE (Bénadryl) 25 mg/co (<i>clientèle 14 ans et plus à l'exception des sites de vaccination</i>)	10 sachets unitaires
Insta-glucose en gel (<i>clientèle 14 ans et plus, exclusif aux milieux avec glucomètre en l'absence de glucagon</i>)	2 tubes
Glucagon (<i>exclusif aux milieux avec glucomètre en l'absence d'Insta glucosé</i>)*	1 ensemble : seringue préremplie de diluant (eau) et une fiole de poudre
Épinéphrine, 1mg/mL inj. 1 mL	1 ampoule, 2 seringues 1mL et 2 aiguilles 25G 1p
Nitroglycérine 0,4 mg/dose (<i>exclusif aux milieux visés par l'OC-6072</i>)	1 vaporisateur

*Il existe différentes marques de glucagon, et les directives peuvent varier selon qu'il doit être conservé à température ambiante ou au réfrigérateur.

Responsable d'installation : _____
Responsable (s) de la trousse : _____
Pharmacie responsable des médicaments : ☐ Hôpital Anna-Laberge ☐ Hôpital du Suroît