

Liste des interventions médicales générant des aérosols reconnus (IMGA) à HAUT RISQUE	
- Intubation et extubation trachéales	- Aspirations des sécrétions trachéales (circuit ouvert)
- Ventilation manuelle	- Bronchoscopie
- Induction d'expectorations	- Autopsie
- Aspiration nasopharyngée chez l'enfant	- Réanimation cardiorespiratoire (excluant les compressions thoraciques)

Précautions aériennes-contact et protection oculaire	
Matériel requis :	
- Masque N95	- Visière de protection
- Bonnet chirurgical (optionnel)	- Blouse imperméable à manches longues
- 2 paires de gants non-stériles	

Revêtir l'équipement de protection individuelle	Retirer l'équipement de protection individuelle → Devrait se faire sous la supervision d'un collègue
 Procéder à l'hygiène des mains	 Retirer la 1 ^{ère} paire de gants
 Mettre la blouse imperméable à manches longues	  Retirer la blouse et la 2 ^e paire de gants en même temps
 Mettre le masque N95	 Procéder à l'hygiène des mains
 Mettre le bonnet chirurgical (optionnel)	 Retirer la visière de protection
 Mettre la visière de protection	 Procéder à l'hygiène des mains
 Mettre une paire de gants à poignets longs	 Retirer le bonnet chirurgical (si revêtu)
 Mettre une 2 ^e paire de gants	 Procéder à l'hygiène des mains (si le bonnet a été revêtu)
→ Les intervenants du bloc opératoire doivent d'abord revêtir la tenue vestimentaire requise.	 Sortir de la pièce
→ Procéder à une double vérification de la conformité de l'ÉPI avec un collègue.	 Procéder à l'hygiène des mains
	 Retirer le masque N95
	 Procéder à l'hygiène des mains