

**OC-6099: Initier un traitement pour la crise d'asthme chez la clientèle
pédiatrique de 2 à 17 ans à l'urgence POUR USAGER DE MOINS DE 20 KG**



FEUILLE D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS (FADM)-24 heures

CISSSMO

CISSSMO

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Dossier:

RAMQ:

Intolérance(s):

Sexe:

Remarques:

Poids (kg):

Taille (cm):

*** Valide du <u>AAAA-MM-JJ</u> à 00:00 au <u>AAAA-MM-JJ</u> à 23:59 ***	(00:00-07:59)	(08:00-15:59)	(16:00-23:59)
Voie d'adm. SALBUTAMOL 100 mcg/dose aer. doseur (#1) (Ventolin) INH OC-6099 Crise d'asthme-Urgence-Usager de 2 à 17ans beta-adrenergiques agonistes Commun 5 inhalations aux 30 à 60 minutes via aérochambre pour 1 2 doses selon évaluation inhalothérapeute Pour usager de moins de 20 kg Bien agiter avant usage CRISE LÉGÈRE (PRAM 1 à 3) Début : Fin :			
SALBUTAMOL 100 mcg/dose aer. doseur (#1) (Ventolin) INH OC-6099 Crise d'asthme-Urgence-Usager de 2 à 17ans beta-adrenergiques agonistes Commun 5 inhalations via aérochambre aux 30 minutes pour 2 doses Pour usager de moins de 20 kg Bien agiter avant usage CRISE MODÉRÉE (PRAM 4 à 5) Début : Fin :			
SALBUTAMOL 100 mcg/dose aer. doseur (#1) (Ventolin) INH OC-6099 Crise d'asthme-Urgence-Usager de 2 à 17ans beta-adrenergiques agonistes Commun 5 inhalations via aérochambre aux 20 minutes pour 3 doses Pour usager de moins de 20 kg Bien agiter avant usage CRISE MODÉRÉE-SÉVÈRE ou SÉVÈRE (PRAM 6 à 12) Si détérioration de l'état clinique ou PRAM 8 et plus: aviser médecin immédiatement Début : Fin :			
IPRATROPIUM 20 mcg/bouf aérol doseur (#2) (Atrovent) INH OC-6099 Crise d'asthme-Urgence-Usager de 2 à 17ans antispasmodiques/antimuscariniques 4 inhalations via aérochambre aux 20 minutes pour 3 doses Bien agiter avant usage CRISE MODÉRÉE-SÉVÈRE ou SÉVÈRE (PRAM 6 à 12) Si détérioration de l'état clinique ou PRAM 8 et plus: aviser médecin immédiatement Début : Fin :			

(R) Refus (EX) Examen (SO) Salle d'opération (AA) Auto-administration (AR) Autre raison (détailler)
 Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.

Précautions lors de la manipulation
 Précautions grossesse et allaitement
 Cytotoxique
 Haut risque

**OC-6099: Initier un traitement pour la crise d'asthme chez la clientèle
pédiatrique de 2 à 17 ans à l'urgence POUR USAGER DE MOINS DE 20 KG**



FEUILLE D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS (FADM)-24 heures

CISSMO

ciSSMO

Nom, Prénom:

Chambre:

Dossier:

Allergie(s):

RAMQ:

Sexe:

Intolérance(s):

Poids (kg):

Remarques:

Taille (cm):

*** Valide du <u>AAAA-MM-JJ</u> à 00:00 au <u>AAAA-MM-JJ</u> à 23:59		(00:00-07:59)	(08:00-15:59)	(16:00-23:59)
*** Nom générique du médicament/nom commercial courant		Voie d'adm.		
DEXAMETHASONE 4 mg/mL sol.inj. fiole 5 mL (Decadron) OC-6099 Crise d'asthme-Urgence-Usager de 2 à 17ans corticostéroïdes MG = _____ mL par la bouche STAT 0,3 mg/kg/dose, maximum 16 mg/jour PO Prélever la dose dans la fiole. Administrer PO diluée ou non CRISE MODÉRÉE-SÉVÈRE ou SÉVÈRE (PRAM 4 à 12) Si détérioration de l'état clinique ou PRAM 8 et plus: aviser médecin immédiatement Début : _____ Fin : _____		PO	Commun	
Init.: _____ Heure: _____	Apposer l'étiquette de la pharmacie et vos initiales OU écrire la nouvelle ordonnance et vos initiales.			
Init.: _____ Heure: _____	Apposer l'étiquette de la pharmacie et vos initiales OU écrire la nouvelle ordonnance et vos initiales.			

FADM vérifiée par : _____ Le : _____

Signature(s)	Init(s)	Signature(s)	Init(s)	Signature(s)	Init(s)

(R) Refus (EX) Examen (SO) Salle d'opération (AA) Auto-administration (AR) Autre raison (détailler)
Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.

Précautions lors de la manipulation	Précautions grossesse et allaitement	Cytotoxique	Haut risque
-------------------------------------	--------------------------------------	-------------	-------------