

CHOIX # 1 – UTILISATION DE LA CAGOULE BLANCHE

IMPORTANT

- Un collègue doit vérifier que l'intervenant, qui entre dans la chambre ou la zone, respecte les étapes ci-dessous.
- Retirer les bijoux, montre, téléavertisseur et téléphone.
- Attacher les cheveux.

Étapes avant d'effectuer des interventions générant des aérosols

Procéder à l'hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique (SHA)	☐
Mettre les couvre-chaussures	☐
Procéder à l'hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique (SHA)	☐
Revêtir la blouse à manches longues imperméable ○ Attacher tous les cordons ○ La blouse doit couvrir complètement l'avant et l'arrière	☐
Mettre le masque N-95 selon la procédure recommandée ○ Passer les élastiques par-dessus la tête et éviter de croiser les élastiques ○ Vérifier l'étanchéité du masque	☐
Mettre la protection oculaire et s'assurer qu'elle couvre bien les yeux → Lunettes de vue ne sont pas une protection suffisante	☐
Mettre la cagoule blanche	☐
Mettre la visière de protection	☐
Mettre une paire de gants à poignet long par-dessus les poignets de la blouse	☐
Mettre une 2 ^e paire de gants	☐
Attendre le signal de l'observateur avant d'entrer dans la chambre	☐

Nom de l'intervenant : _____

Titre d'emploi: _____

Observateur : _____

Lieu : _____ Date : _____aaaa/mm/jj_____ Heure : _____hh:mm_____

Vérification – Revêtir et retirer l'EPI lors d'interventions médicales générant des aérosols à haut risque/cagoule blanche

IMPORTANT

- Un collègue doit s'assurer de la conformité lors du retrait de l'EPI.
- Déposer tout EPI retiré dans le sac à déchet.
- Disposer le masque N-95 selon la procédure en vigueur.

À l'intérieur de la chambre	
Retirer la première paire de gant de façon sécuritaire en suivant la technique	☐
Retirer la visière de protection ○ Se pencher légèrement vers l'avant ○ Agripper l'élastique derrière la tête	☐
Retirer la cagoule blanche ○ Se pencher légèrement vers l'avant ○ Pincer le dessus de la cagoule et la glisser vers l'avant pour la retirer	☐
Retirer la blouse à manches longues avec les gants au même moment ○ Détacher le cordon sur le côté ○ Tirer légèrement la blouse à la taille ○ Croiser les bras au niveau des épaules pour retirer la blouse : retirer la 1^{ère} manche et le premier gant par la partie contaminée, ensuite retirer l'autre manche et le gant par l'intérieur de la blouse avec la main qui n'est plus gantée et l'éloigner du corps	☐
Procéder à l'hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique (SHA)	☐
Retirer les couvre-chaussures	☐
Procéder à l'hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique (SHA)	☐

À l'extérieur de la chambre ou dans l'antichambre	
Procéder à l'hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique (SHA)	☐
Retirer la protection oculaire la disposer pour la désinfecter ultérieurement	☐
Procéder à l'hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique (SHA)	☐
Retirer le masque N-95 ○ Se pencher légèrement la tête vers l'avant ○ Agripper l'élastique en bas du masque, le garder tendu et l'amener vers l'avant ○ Garder une main sur l'élastique tendu et retirer l'autre élastique avec l'autre main → Ne pas toucher le devant du masque ○ Disposer le masque selon la procédure en vigueur	☐
Procéder à l'hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique (SHA)	☐

Nom de l'intervenant : _____

Titre d'emploi: _____

Observateur : _____

Lieu : _____ Date : _____ aaaa/mm/jj Heure : _____ hh:mm

Vérification – Revêtir et retirer l'EPI lors d'interventions médicales générant des aérosols à haut risque/cagoule blanche