

Consignes à suivre :				À valider lors de la vérification de chaque produit :										
Faire la vérification du coffre une fois par quart et après chaque utilisation		Inscrire la date de la vérification		1. La date de péremption					2. La disponibilité du produit					
Faire un crochet ü dans la case lorsque validé		Apposer votre signature de façon lisible		3. L'étanchéité du produit					4. La bonne quantité du produit					
aaaa				mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
	Manomètres des 2 bombonnes ≥ 500 kPa (O ₂ et air médical)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1	Poire d'aspiration			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1	Perle cutanée+ collant réflecteur			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1	Stéthoscope néonatal			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1	Capteur de saturation Nellcor et Neo Massimo			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Cathéter 10 Fr prêt avec une aspiration réglée entre 80 et 100 mmHg) <i>*Vérification du fonctionnement de la succion à faire à la chambre avant utilisation</i>			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1	Bouteille d'eau stérile 59 mL			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Ballon anesthésie et insufflateur néonatal : O ₂ réglée entre 21% et 30% et PEEP à 5 <i>*Vérifier fonctionnement et l'étanchéité de la ventilation. Faire à la chambre avant utilisation</i>			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
TABLE CHAUFFANTE : Tiroir#														
1	Ruban pour saturomètre (Anna-Laberge seulement)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1	Masque laryngé igel (Anna-Laberge seulement)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1	Pince à cordon			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1	Ruban à mesurer			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1	Grand sac de plastique (pour prématuré incluant tuque)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Initiales :														

aaaa		mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
TABLE CHAUFFANTE : Tiroir#													
1	Ballon auto gonflable	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Cathéter d'aspiration 6 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Cathéter d'aspiration 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Cathéter d'aspiration 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tube gastrique 8Fr et seringue 10 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Feuilles de notes « Réanimation néonatale » (CLI-60591, CLI-60593)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
MATÉRIEL POUR FILTRATION TRANSFUSION D'UN BOLUS DE CULOT SANGUIN													
1	Filtre sanguin 40 microns	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Seringue de 30 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Dispositif d'accès au sac non ventilé avec connecteur sans aiguille : « Perforateur non ventilé avec valve 2 voies »	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	• Seringue de 3 à 5 mL de NaCl 0,9% (administration intraosseuse); • Seringue de 10 mL de NaCl 0,9% (irrigation après la transfusion)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :													

aaaa		mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
PARTICULARITÉ ANNA-LABERGE : TROUSSE POUR CATHÉTER OMBILICAL D'URGENCE													
1	Champ stérile fenestré	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters ombilicaux 5fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Robinet 3 voies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Scalpel (lame 11)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tiges de Chlorhexidine 0,5% avec Alcool 70%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Seringue de 10 mL de NS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Compresse 4x4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Pince griffe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Pince dissection	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tégaderm taille adulte	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Ruban en tissu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Aide-mémoire pour l'installation	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :													

Signature de l'infirmière	Initiales	Signature de l'infirmière	Initiales	Signature de l'infirmière	Initiales