

INTERVENTION	
☐ Minimale (3 minutes) ➤ Identification du statut ➤ Identification du stade Avis de cessation ou de protection (message clair) Orientation vers les services (si pertinent)	☐ Brève (3 à 10 minutes) ➤ Identification du statut ➤ Identification du stade ➤ Identification de la motivation Counseling adapté à l'étape du changement Avis de cessation ou de protection (message clair) Orientation ou Référence vers les services (si pertinent)

STADES DE CHANGEMENT : PRÉ RÉFLEXION, RÉFLEXION, PRÉPARATION, ACTION, MAINTIEN	
L'utilisateur souhaite-t-il arrêter de fumer?	
☐ Non :	Stade de la pré réflexion (usager non-prêt)
☐ Oui, mais dans plus d'un mois :	Stade de la réflexion (usager non-prêt)
☐ Oui, au cours du prochain mois :	Stade de préparation (usager prêt)
Une intervention brève nécessite une statistique dans le ICLSC : Intervention individuelle Raison 1 : Inscrire la raison principale de votre intervention (maladie, trouble ou autres) Raison 2 ou 3 : 4204 – Problème relié au tabac Acte 1 : Inscrire l'acte principal de votre intervention (éval., suivi ou autres) Acte 2 ou 3 : 6970 – Actions éducatives et préventives concernant l'usage du tabac 6980 – Actions de soutien à l'abandon du tabagisme 6407 – Prescription infirmière (remise d'une ordonnance)	

Source : Gervais et al. (2010). Pratiques cliniques préventives, objectif santé. Note de services; archivistes-conseil au cadre normatif, 2018-10-02			
Direction émettrice	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Entrée en vigueur :	2019-03-15
AMC-DSIEU-6007		Révision :	