

Aide-mémoire portant sur les insulines

Insuline	Disponibilité au CISSS MO	Début d'action (minutes)	Pic d'action (heure)	Durée d'action (heures)	Moment d'administration
Rapide					
Apidra (glulisine)	Non	5 à 25	0,75 à 1,5	4	0 à 10 minutes avant le repas ou juste après le repas (ad 20 min après le début du repas)
Humalog (lispro)	Fiole de 3 mL ou stylo Kwikpen jetable Doit être utilisée pour l'OIPI échelle d'insuline	5 à 30	0,75 à 2,5	3,5 à 4,75	
NovoRapid (aspartate)	Non	10 à 20	1 à 3	3 à 5	
Fiasp (aspartate)	Non	5 à 10	1 à 3	3 à 5	0 à 2 minutes avant le repas ou juste après le repas (ad 20 minutes après le début du repas)
Régulière					
Humulin R	Fiole de 3 mL ou stylo Kwikpen jetable	30	2 à 5	6 à 8	30 à 45 minutes avant le repas
Novolin Toronto	Non	30	2 à 5	6 à 8	
Mixte					
Humulin 30/70	Non				30 à 45 minutes avant le repas
Novolin 30/70	En cartouche pour stylo Novolin Pen fournit par la pharmacie				
Novolin 40/60					0 à 10 minutes avant le repas ou juste après le repas (ad 20 min après le début du repas)
Novolin 50/50					
Novomix 30					
Humalog 25 et 50	Stylo Kwikpen jetable				
Intermédiaire					
Humulin N	Fiole de 3 mL ou stylo Kwikpen jetable	60 à 120	4 à 12	14 à 24	1 à 2 fois par jour sans égard aux repas
Novolin NPH	Non	60 à 120	4 à 12	14 à 24	
Lente					
Lévémir (détémir)	Stylo Flextouch jetable	90	Pas de pic significatif	6 à 24 (dose dépendante)	1 à 2 fois par jour sans égard aux repas
Basaglar (glargine)	Stylo Kwikpen jetable	90		24 et plus	1 fois par jour sans égard aux repas
Lantus (glargine)	Non	90			
Toujeo (glargine)	Non	Au cours d'une période de 6h suivant la 1 ^{re} dose			

N.B. Les doses de plus de 50 unités doivent être injectées en deux sites pour assurer le confort du patient.

Les stylos et les fioles se conservent pendant 28 jours après ouverture au réfrigérateur ou à la température ambiante. Les stylos et les fioles ne doivent jamais être remis au réfrigérateur une fois utilisés et doivent être utilisés pour UN seul patient.