

RÈGLE	CONDUITE
L'écart entre les doses ne doit pas dépasser 50% de la plus faible dose prescrite, à moins que la dose maximale soit inférieure ou égale à morphine 5 mg par voie orale (ou son équivalent)	- Déterminer si la dose maximale prescrite dépasse morphine 5 mg PO (ou son équivalent). - Ajuster la dose maximale pour qu'elle soit égale à 1,5 fois la dose minimale, s'il y a lieu. Exemple : Morphine 2,5 à 5 mg PO → aucun ajustement requis Morphine 5 à 10 mg PO devient Morphine 5 à 7,5 mg PO - Si perfusion d'opiacé en cours, se référer au pharmacien.
Les doses orales PO/parentérales (IM, IV, SC) doivent être équianalgésiques	Ajuster la dose IM, IV, SC s'il y a lieu Exemple : Morphine 10 mg PO/SC devient Morphine 10 mg PO et 5 mg SC
L'intervalle d'administration doit être fixe	Ajuster la posologie à l'intervalle le plus court si l'écart d'intervalle prescrit. Exemple : Morphine 5 mg PO q 4-6 h PRN devient Morphine 5 mg PO q 4 h PRN

Tableau 1 – Équivalence entre les différents opiacés et morphine à dose de référence

Médicament	Dose orale équivalente (mg)	Dose IM/SC/IV équivalente (mg)	Intervalle d'administration habituel (h)
Morphine	5	2,5	4
Hydromorphone	1	0,5	4
Oxycodone	2,5	-	4
Mépéridine	50	25	4
Fentanyl	-	0,025	1
Tramadol	50	-	4

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Utilisation sécuritaire des opiacés- conduite lors du traitement de l'ordonnance à la pharmacie

Tableau A - MORPHINE

Prescription	Correction
1-2 mg IV/SC	-
2-3 mg IV/SC	-
2-3 mg PO	2,5 mg PO
2-4 mg IV/SC	2-3 mg SC
2-4 mg PO	2,5-5 mg PO
2,5 mg PO/IV/SC	2,5 mg PO 1,25 mg IV/SC
2,5-5 mg PO/IV/SC	2,5-5 mg PO 1,25-2,5 mg IV/SC
2,5-5 mg IV/SC	2,5-3,75 mg IV/SC
2,5-5 mg PO	-
3-4 mg PO/IV/SC	3-4 mg PO 1,5-2 mg IV/SC
3-4 mg PO	2,5-5 mg PO
3-5 mg PO/IV/SC	3-5 mg PO 1,5-2,5 mg SC
3-5 mg IV/SC	3-4,5 mg IV/SC
5 mg PO/IV/SC	5 mg PO 2,5 mg IV/SC
5-10 mg PO/IV/SC	5-7,5 mg PO 2,5-3,75 mg IV/SC
5-10 mg IV/SC	5-7,5 mg IV/SC
5-10 mg PO	5-7,5 mg PO
10-15 mg PO/IV/SC	10-15 mg PO 5-7,5 mg IV/SC
10-15 mg IV/SC	-
10-15 mg PO	-
10-20 mg PO/IV/SC	10-15 mg PO 5-7,5 mg SC
10-20 mg IV/SC	10-15 mg IV/SC
10-20 mg PO	10-15 mg PO
15-20 mg PO/IV/SC	15-20 mg PO 7,5-10 mg IV/SC
15-20 mg IV/SC	-
15-20 mg PO	-

Tableau B – HYDROMORPHONE (Dilaudid)

Prescription	Correction
0,5 mg PO/IV/SC	0,5 mg PO 0,25 mg IV/SC
0,5-1 mg PO/IV/SC	0,5-1 mg PO 0,25-0,5 mg IV/SC
0,5-1 mg IV/SC	0,5-0,75 mg IV/SC
0,5-1 mg PO	-
1 mg PO/IV/SC	1 mg PO 0,5 mg IV/SC
1-1,5 mg PO/IV/SC	1-1,5 mg PO 0,5-0,75 mg IV/SC
1-1,5 mg IV/SC	-
1-1,5 mg PO	-
1-2 mg PO/IV/SC	1-1,5 mg PO 0,5-0,75 mg IV/SC
1-2 mg IV/SC	1-1,5 mg IV/SC
1-2 mg PO	1-1,5 mg PO
1-3 mg PO/IV/SC	1-1,5 mg PO 0,5-0,75 mg IV/SC
1-3 mg IV/SC	1-1,5 mg IV/SC
1-3 mg PO	1-1,5 mg PO
2 mg PO/IV/SC	2 mg PO 1 mg IV/SC
2-3 mg PO/IV/SC	2-3 mg PO 1-1,5 mg IV/SC
2-3 mg IV/SC	-
2-3 mg PO	-
2-4 mg PO/IV/SC	2-3 mg PO 1-1,5 mg IV/SC
2-4 mg IV/SC	2-3 mg IV/SC
2-4 mg PO	2-3 mg PO
3-4 mg PO/IV/SC	3-4 mg PO 1,5-2 mg SC
3-4 mg IV/SC	-
3-4 mg PO	-

Références : Vigilance Santé

Direction émettrice : Direction des services professionnels et de l'enseignement médical

Entrée en vigueur : 2026-02-03

AMC-DSPPEM-10010 (2026-01-27)

Révision : 2026-02-05

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Utilisation sécuritaire des opiacés- conduite lors du traitement de l'ordonnance à la pharmacie

Tableau C – OXYCODONE (Supeudol)

Prescription	Correction
2,5-5 mg PO	2,5-3,75 mg PO
5-10 mg PO	5-7,5 mg PO
5-7,5 mg PO	-
7,5-10 mg PO	-
10-15 mg PO	-
10-20 mg PO	10-15 mg PO

Tableau D – MÉPÉRIDINE* (Démérol)

Prescription	Correction
50-75 mg PO/SC/IM	50 mg PO 25 mg SC/IM
50-75 mg SC/IM	-
50-100 mg PO	50 mg PO
50-100 mg SC/IM	50-75 mg SC/IM
50-100 mg PO/SC/IM	50 mg PO 25 mg SC/IM
100 mg PO/SC/IM	100 mg PO 50 mg SC/IM

*La mépéridine PO est disponible en capsule de 50 mg. Il n'est pas possible de fractionner la dose.

NB. Usage restreint en cas d'allergies multiples aux narcotiques ou frissons post-opératoires.

Tableau E - TRAMADOL

Prescription	Correction
25-50 mg PO	-
50-75 mg PO	-
50-100 mg PO	50-75 mg PO
75-100 mg PO	-