

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Tableau des précautions additionnelles – Hôpital Barrie Memorial

Nouveaux usagers dépistés porteurs d'une bactérie multi-résistante ou présentant des diarrhées ou infection

Si usager en précautions additionnelles (isolement) :

***Ne jamais transférer les meubles (lit, somno, table et chaise) dans une autre chambre. Déplacer les usagers en civière ou en chaise roulante. Le changement de rideau au départ ou transfert des usagers porteurs ou suspectés d'une diarrhée, d'une bactérie multirésistante ou une infection, doit être fait par hygiène et salubrité.**

Le matériel se trouvant dans les chambres au moment du départ de l'utilisateur le suivent dans sa prochaine chambre ou sont jetés aux ordures


Aucune admission au CCU pour les usagers en précaution aérienne et gouttelette-contact sauf si l'utilisateur est seul au CCU

	Mobilisation	Dépistage	Désinfection (HS)	Particularités	Affichette
SARM+ +SAR	▪ Urgence : Isoler à la civière avec chaise d'aisance ▪ 3^e étage : Doit être en chambre privéeⁱ sauf avis contraire de la PCI.	▪ Dépister l'usager à ses côtés (si chambre semi-privée) et ne pas l'isoler ▪ Ne pas fermer le lit ▪ Suivi de l'usager par le service de PCI	▪ Désinfecter quotidiennement selon l'affichage ▪ Désinfecter l'espace usager SARM + la toilette et les surfaces high touch dans la chambre avec le désinfectant en vigueur avant toute réadmission ▪ Au départ, changer les rideaux	▪ Matériel dédié ▪ <u>Aucun jumelage</u> ne peut être effectué en l'absence du service PCI sur place ▪ Sauf si avis du service PCI, les usagers doivent être mis en chambre privée ▪ Chaise d'aisance si pas de toilette dans la chambre	
ERV ou Suspect ERV +ERV	▪ Urgence : Isoler à la civière et chaise d'aisance ▪ 3^e étage : Doit être en chambre privée sauf avis contraire de la PCI	▪ Dépister pt à ses côtés (si chambre semi-privée) et mettre le voisin de chambre en contact ERV ▪ Isoler le contact ERV dans chambre privée ou semi-privée (voir avec le service PCI) ▪ <u>Toujours séparer le suspect ERV du contact ERV</u>	▪ Désinfecter quotidiennement selon l'affichage ▪ Désinfecter la chambre <u>au complet</u> 2 fois avec désinfectant en vigueur avant toute réadmission ▪ Au départ, changer les rideaux	▪ Matériel dédié ▪ Pince de suture jetable si disponible ▪ Suivi de l'isolement par le service de PCI ▪ <u>Aucun jumelage</u> ne peut être effectué en l'absence du service PCI sur place ▪ Chaise d'aisance si pas de toilette dans la chambre	

Références : Guide de prévention des infections (2019). Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf>

Guide d'intervention – La tuberculose (2017) Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-271-05W.pdf>

AMC-DG-10020

	Mobilisation	Dépistage	Désinfection (HS)	Particularités	Affichette
Contact ERV PERV	Urgence : Isoler à la civière et chaise d'aisance 3^e étage : Isolement au chevet	- Dépister l'usager à l'arrivée et tel que recommandé par la PCI - Suivi de l'isolement par le service de PCI	- Désinfecter quotidiennement selon l'affichage - Désinfecter l'environnement de l'usager et la toilette selon l'affichette en place avant toute réadmission - Au départ, changer les rideaux	- Matériel dédié - Pince de suture jetable si disponible - Attribuer la salle de bain à un usager et une chaise d'aisance à l'autre (gestion faite par l'équipe de soins et indiquer à la porte de salle de bain qui est l'utilisateur)	
Dépistage Préventif SARM/ERV /EPC-A PPES/PEPC	- Pt ayant séjourné dans un établissement autre que le HBM (CHSLD, Centre de réadaptation, autres hôpitaux, autres pays etc.) Urgence : Isoler à la civière et chaise d'aisance 3^e étage : Isolement au chevet	- Dépister l'usager à l'arrivée et tel que recommandé par la PCI - Suivi de l'isolement par le service de PCI	- Désinfecter quotidiennement selon l'affichage - Désinfecter l'environnement de l'usager et la toilette selon l'affichette en place avant toute réadmission - Au départ, changer les rideaux	- Matériel dédié - Attribuer la salle de bain à un usager et l'autre une chaise d'aisance (gestion faite par l'équipe de soins et indiquer à la porte de salle de bain qui est l'utilisateur)	
MDRO (ESBL) (BGNMR groupe 2) dans spécimen clinique ex. : urine, plaie, etc. +ESB	Isoler en chambre privée	- Ne pas isoler ni dépister le voisin de chambre (si ch. Semi-privée), ne pas fermer l'autre lit - Suivi de l'isolement par le service de PCI	- Désinfecter quotidiennement selon l'affichage - Désinfecter l'environnement de l'usager et la toilette selon l'affichette en place avant toute réadmission - Au départ changer les rideaux	- Matériel dédié - Pince de suture jetable si disponible <u>Aucun jumelage</u> ne peut être effectué en l'absence du service PCI sur place - Chaise d'aisance si pas de toilette dédiée dans la chambre	

Références : Guide de prévention des infections (2019). Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf>
Guide d'intervention – La tuberculose (2017) Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-271-05W.pdf>

Direction émettrice : Direction générale	Entrée en vigueur : 2024-12-11
AMC-DG-10020	Révision : 2025-12-19

Tableau des précautions additionnelles – Hôpital Anna-Laberge

	Mobilisation	Dépistage	Désinfection (HS)	Particularités	Affichette
EPC ou Suspect EPC +EPC	▪ Urgence : Isolement à la civière et utilisation de la chaise d'aisance ▪ 3^e étage : Isolation en chambre privée sauf avis contraire de la PCI	▪ Dépister pt à ses côtés (si chambre semi-privée) et mettre le voisin de chambre en précaution contact EPC ▪ Séparer le suspect du contact étroit ▪ Mettre le contact étroit en chambre semi-privée si possible	▪ Désinfecter quotidiennement selon l'affichage ▪ Au congé ou transfert, désinfecter la chambre <u>au complet</u> avec désinfectant en vigueur avant toute réadmission ▪ Au départ, changer les rideaux	▪ Matériel dédié ▪ Pince de suture jetable si disponible ▪ Suivi de l'isolement par le service de PCI ▪ <u>Aucun jumelage</u> ne peut être effectué en l'absence du service PCI sur place ▪ Chaise d'aisance si pas de toilette dédiée dans la chambre	
Contact EPC PEPC	▪ Urgence : Isolement à la civière avec chaise d'aisance ▪ 3^e étage : Isolement au chevet	▪ Suivi de l'isolement par le service de PCI ▪ Dépister l'usager à l'arrivée et tel que prescrit par la PCI	▪ Désinfecter quotidiennement selon l'affichage et lors du congé ▪ Au départ, changer les rideaux	▪ Matériel dédié ▪ Pince de suture jetable si disponible ▪ Attribuer la salle de bain à un usager et une chaise d'aisance d'aisance à l'autre (gestion faite par l'équipe de soins et indiquer à la porte de salle de bain qui est l'utilisateur)	

AMC-DG-10020

2024-12-11

2025-12-19

	Mobilisation	Dépistage	Désinfection (HS)	Particularités	Affichette
<i>Acinetobacter baumannii</i> multi résistant (BGNMR groupe 1) + ACI	- Pt en chambre privée Obligatoirement - Aucune admission au CCU	- Dépister pt à ses côtés (si chambre semi-privée) et mettre en contact « A » - Isoler le contact étroit en contact « A » (PACI) dans chambre semi-privée <u>prioritairement</u>	- Désinfecter quotidiennement selon l'affichage - Lors du congé, désinfection de la chambre <u>au complet</u> (les 2 lits si ch. semi-privée) - Au départ, changer les rideaux	- Matériel dédié - Pince de suture jetable si disponible - Aucun jumelage ne peut être effectué en l'absence du service PCI sur place - Chaise d'aisance si pas de toilette dédiée dans la chambre	
Dépistage préventif /Contact élargi <i>Candida Auris</i> PCAU	- Pt ayant séjourné dans un établissement en éclosion, ou dans une autre province ou un autre pays etc.) - Urgence : Isolement à la civière et chaise d'aisance 3^e étage : Isolement au chevet et chaise d'aisance - Usager contact étroit d'un cas de <i>Candida Auris</i> - Urgence : Isoler à la civière et chaise d'aisance 3^e étage : Doit être en chambre privée	- Isoler l'usager en « contact C » dans chambre privée <u>Prioritairement</u> - Dépister l'usager à l'arrivée et tel que demandé par le service PCI	- Désinfecter quotidiennement selon l'affichage et lors du congé - Au départ, changer les rideaux	- Matériel dédié - Pince de suture jetable si disponible - Attribuer la salle de bain à un usager et l'autre une chaise d'aisance (gestion faite par l'équipe de soins et indiquer à la porte de salle de bain qui est l'utilisateur)	

Références : Guide de prévention des infections (2019). Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf>
Guide d'intervention – La tuberculose (2017) Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-271-05W.pdf>

Direction émettrice :	Direction générale	Entrée en vigueur :	2024-12-11
AMC-DG-10020		Révision :	2025-12-19

	Mobilisation	Dépistage	Désinfection (HS)	Particularités	Affichette
<i>Candida Auris</i> +CAU	- Pt en chambre privée obligatoirement Urgence : Isolement à la civière et chaise d'aisance 3^e étage : Doit être en chambre privée Aucune admission au CCU	- Dépister pt à ses côtés (si chambre semi-privée) et mettre en contact « C » - Isoler le contact étroit en « contact C » dans chambre privée prioritairement	- Désinfecter quotidiennement selon l'affichage - Au congé, désinfection de la chambre au complet (les 2 lits si ch. semi-privée) - Au départ, changer les rideaux	- Matériel dédié - Pince de suture jetable si disponible - Chaise d'aisance si pas de toilette dans la chambre privée. - Aucun jumelage ne peut être effectué en l'absence du service PCI sur place	
<i>Clostridioides difficile</i>/ Diarrhée¹ associée au C.Difficile CO+	- Pt ayant la diarrhée et en attente de résultat est installé en précautions additionnelles « Contact + » et peut rester en chambre semi-privée Urgence : Isolement à la civière et chaise d'aisance 3^e étage : Doit être en chambre privée si résultat + Aucune admission au CCU	- Dépistage non demandé pour le voisin de chambre (si ne présente pas de diarrhées), donc pas d'isolement nécessaire - Suivi de l'isolement par le service de PCI	Lors de résultat de Toxine + par PCR pour un usager en chambre semi-privée : - Désinfection de la chambre au complet (les 2 environnements et salle de bain) en 3 étapes : désinfectant en vigueur – rinçage eau – solution chlorée et changer les rideaux - Après cette désinfection le voisin de chambre peut réintégrer sa place sans isolement - Désinfecter quotidiennement selon l'affichage	- Matériel dédié - Pince de suture jetable si disponible - Lingettes de solution chlorée - Ne pas jumeler les usagers +. - Chaise d'aisance si pas de toilette dédiée	

¹ Se référer à la note de service du 2019-04-09 : Gestion des usagers lors des précautions additionnelles lors d'un dépistage de *C. difficile*.

Références : Guide de prévention des infections (2019). Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf>
Guide d'intervention – La tuberculose (2017) Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-271-05W.pdf>

Direction émettrice :	Direction générale	Entrée en vigueur :	2024-12-11
AMC-DG-10020		Révision :	2025-12-19

	Mobilisation	Dépistage	Désinfection (HS)	Particularités	Affichette
Gastro-entérite (Nausées et/ou Vomissements et/ou diarrhées) +G/C	Urgence : Isolement à la civière et chaise d'aisance - Si admission de l'urgence : ch. privée - Si sur département : ch. semi-privée isoler en chambre les 2 usagers (attention ils sont aussi isolé l'un de l'autre) - Le voisin du cas symptomatique devient obligatoirement en isolement préventif, garder les 2 usagers dans la même chambre et en isolement gouttelette-contact (PG/C) - Aucune admission au CCU	Suivi de l'isolement par le service de PCI	- Désinfecter quotidiennement selon l'affichage - Lors du congé ou de la levée des précautions additionnelles, désinfection de la chambre au complet selon l'affichette à la porte et changer les rideaux - Si l'un des usagers à son congé, transférer l'autre dans une chambre privée ad suivi du service PCI	- Matériel dédié - Pince de saturo jetable si disponible Si plus de 3 selles liquides en 24h modifier l'affiche pour la gouttelette-contact+ et demander un dépistage pour recherche C. Difficile Chaise d'aisance si pas de toilette dédiée dans la chambre	
Influenza/VRS +G/C	Urgence : Isolement à la civière - Si admission de l'urgence : iso gouttelettes-contact en ch. privée - Si découvert sur l'unité de soins : usagers ensemble depuis <u>moins de 4 heures</u>, vous séparez les usagers pour transférer l'utilisateur symptomatique en chambre privée avec iso gouttelette-contact. - Si ensemble depuis <u>plus de 4 heures</u>, garder les 2 usagers dans la même chambre avec séparation physique (rideau ou paravent) - Aucune admission au CCU	- Suivi de l'isolement par le service de PCI - Le voisin de chambre ne nécessite pas de dépistage influenza ou VRS, seulement si présence de symptômes.	- Désinfection quotidienne selon l'affichage - À la levée de l'isolement désinfection de la chambre au complet selon l'affichette à la porte et changer les rideaux - Si l'un des usagers à son congé, transférer l'autre dans une chambre privée ad suivi du service PCI	- Matériel dédié - Pince de saturo jetable si disponible - Ne pas jumeler les différents virus dans la même chambre	

Références : Guide de prévention des infections (2019). Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf>
 Guide d'intervention – La tuberculose (2017) Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-271-05W.pdf>

Direction émettrice : Direction générale
 AMC-DG-10020

Entrée en vigueur : 2024-12-11
 Révision : 2025-12-19

Tableau des précautions additionnelles – Hôpital Anna-Laberge

[illegible]

2025-12-19

	Mobilisation	Dépistage	Désinfection (HS)	Particularités	Affichette
Varicelle +A/C	- Admission ch. privée précaution aériennes et contact avec pression négative (adulte et enfant) - Aucune admission au CCU	Choix de Chambre pour la pression négative : - Urg : PN 3^e : Dans l'attente d'une vraie chambre à pression négative (pas de système ATAC) l'utilisateur doit être seul dans une chambre avec la porte fermée en tout temps	- Désinfecter quotidiennement selon l'affichage et lors du congé - Au départ, changer les rideaux - Respecter le temps d'attente selon le nombre d'échange d'air ou attendre 6 heures si l'information est non connue	- Matériel dédié - Pince de suture jetable - Chaise d'aisance si aucune toilette dans la chambre privée.	
Tuberculose suspectée ou confirmée +AÉR	- Admission en ch. privée et pression négative (PN) selon trajectoire établie (pas de chambre PN avec ventilation permanence au HBM 3^e étage) - Précaution add. Aériennes seulement. Si usager suspecté déjà Ho en chambre partagée : - Relocaliser le voisin de chambre (pas d'ajout de précautions additionnelles requises pour lui) - Fermer la porte de cette chambre partagée où est l'utilisateur suspecté en attendant que la chambre à PN se libère - Usager suspecté en chambre privée avec pression négative (PN)	<u>Le suivi de l'isolement est effectué par le médecin</u> Choix de Chambre pour la pression négative : - Urg : PN 3^e : Dans l'attente d'une vraie chambre à pression négative (pas de système ATAC) l'utilisateur doit être seul dans une chambre avec la porte fermée en tout temps	Attendre : 60 min. en salle d'op - Pas de temps en radiologie ou salle de traitement <u>si l'utilisateur a porté son masque</u> - Si non respect du port de masque ou retrait durant l'examen ou IMGA effectué respecter le temps d'attente selon le nombre d'échanges d'air ou 6 heures si l'information est non disponible - Au départ, changer les rideaux seulement si visiblement souillé	- Désinfectant en vigueur - Matériel dédié - Pince de suture jetable - Chaise d'aisance si pas de toilette dédiée dans la chambre	

Références : Guide de prévention des infections (2019). Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf>
Guide d'intervention – La tuberculose (2017) Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-271-05W.pdf>

Direction émettrice : Direction générale

Entrée en vigueur :

2024-12-11

AMC-DG-10020

Révision :

2025-12-19

Tableau des précautions additionnelles – Hôpital Anna-Laberge

[illegible]

2025-12-19

	Mobilisation	Dépistage	Désinfection (HS)	Particularités	Affichette
	- Faire désinfecter la chambre après le temps d'attente - Aucune admission au CCU				
MRSI (Maladie respiratoire sévère infectieuse) +A/C	- Précaution add. Aériennes-contact et protection oculaire - Admission en ch. privée et pression négative (PN) - Si aucune chambre à pression négative n'est disponible : placer l'usager dans une chambre individuelle avec porte fermée et toilette individuelle ou chaise d'aisance en attente qu'une chambre à pression à négative se libère - Aucune admission au CCU	Choix de chambre pour les précautions aériennes : - Urg PN 3^e : Dans l'attente d'une vraie chambre à pression négatif (pas de système ATAC) l'usager doit être seul dans une chambre avec la porte fermée en tout temps.	Attendre : 60 min. en salle d'op - Pas de temps en radiologie ou salle de traitement si l'usager a porté son masque - Si non respect du port de masque ou retrait durant l'examen ou IMGA effectué respecter le temps d'attente selon le nombre d'échanges d'air ou 6 heures si l'information est non disponible - Au départ, changer les rideaux	- Désinfectant en vigueur - Matériel dédié - Pince de saturo jetable - Chaise d'aisance si pas de toilette dédiée dans la chambre	

Références : Guide de prévention des infections (2019). Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf>
Guide d'intervention – La tuberculose (2017) Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-271-05W.pdf>

Direction émettrice : Direction générale

Entrée en vigueur :

2024-12-11

AMC-DG-10020

Révision :

2025-12-19

Tableau des précautions additionnelles – Hôpital Anna-Laberge

Références : Guide de prévention des infections (2019). Repéré à : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf			
Guide d'intervention – La tuberculose (2017) Repéré à : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-271-05W.pdf			
Direction émettrice :	Direction générale	Entrée en vigueur :	2024-12-11
AMC-DG-10020		Révision :	2025-12-19

	Mobilisation	Dépistage	Désinfection (HS)	Particularités	Affichette
	- Admission : en précaution aérienne contact protection oculaire en chambre avec pression négative soit seul ou avec un autre usager Covid + . - Aucune admission au CCU	civières ciblées en PA aériennes-contact et protection oculaire. Si l'usager à un contact de la même pièce couchée, le voisin est mis en PA gouttelettes-contact seul	nombre d'échanges d'air ou 6 heures si l'information est non disponible Au départ, changer les rideaux		
Punaise de lit +CO	- Isolement contact (ch. privée) et retrait des vêtements et objets personnels pour éviter la dispersion dans l'environnement - Mettre le tout dans un double sac fermé hermétiquement et retourner les effets à la maison	N/A	- Aviser le service d'hygiène et salubrité au départ pour une désinfection adéquate de l'environnement de l'endroit où se trouvait la personne avant le déshabillage. (Balayeuse à filtre HEPA+ désinfection) - Au départ, changer les rideaux	- S'informer si les visiteurs vivent dans le même milieu - Si oui : manteaux et effets personnels dans un double sac de plastique bien fermé et le laisser dans la chambre de l'usager. À la fin de la visite, accompagnez les visiteurs à la sortie pour une gestion adéquate des vêtements. Le sac ayant servi aux effets personnels devra être jeté	

Références : Guide de prévention des infections (2019). Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf>
Guide d'intervention – La tuberculose (2017) Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-271-05W.pdf>

Direction émettrice :	Direction générale	Entrée en vigueur :	2024-12-11
AMC-DG-10020		Révision :	2025-12-19

	Mobilisation	Dépistage	Désinfection (HS)	Particularités	Affichette
Poux/ Gale +CO	- Admission en chambre privé - Procédé au retour des effets personnels et des vêtements à la famille ou procédé au lavage de ces derniers.	N/A	- Aviser le service d'hygiène et salubrité au départ pour une désinfection adéquate de l'environnement avec balayeuse munie d'un filtre hepa - Au départ, changer les rideaux	- Matériel dédié - Pince de suture jetable *** Hygiène des mains avec eau et savon exclusivement***	

Mise à jour : 2025-12-19

Entretien des équipements de soins qui sont en contact avec l'utilisateur et/ou son environnement			
* Si souillures visibles une lingette doit être utilisée avant de procéder à la désinfection *			
	A 1 étape : Lingette	B 2 étapes : Lingettes désinfectantes	C 1 étape : Détergent – eau – Solution chlorée approuvée
	A 1 étape : Peroxyde d'hydrogène	B 2 étapes : Peroxyde d'hydrogène	C 3 étapes : Détergent – eau – Solution chlorée approuvée

ⁱ Pour le HBM la notion de chambre privée signifie que l'utilisateur est seul à sa chambre.

Références : Guide de prévention des infections (2019). Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf>
Guide d'intervention – La tuberculose (2017) Repéré à : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-271-05W.pdf>

Direction émettrice : Direction générale	Entrée en vigueur : 2024-12-11
AMC-DG-10020	Révision : 2025-12-19