

DÉMARCHES LORSQU'UN INTERVENANT EFFECTUE UN ÉCOUVILLONAGE
ORO-NASOPHARYNGÉ POUR RECHERCHE DE SARS-CoV-2

Matériel requis pour dépistage COVID-19:

1 bouteille de solution hydro-alcoolique (SHA)	1 blouse à manches longues
1 masque de procédure	1 protection oculaire
1 sac poubelle XL	1 piqué jetable
1 sac biorisque	3 paires de gants non stériles
2 lingettes désinfectantes	1 étiquette d'identification de spécimen
1 sac de type « Ziploc »	

En entrant dans le domicile

- Procéder à l'hygiène des mains par friction avec la SHA;
- Frapper à la porte ou sonner, entrer et demander à l'utilisateur et à ses proches de maintenir une distance de 2 mètres avec vous :
 - L'utilisateur et ses proches ne devront plus entrer dans la zone de 2 mètres près de la porte extérieure;
- Déposer le sac contenant les ÉPI au sol près de la porte extérieure (à l'intérieur de la maison);
- Déposer le piqué jetable par terre près de la porte;
- Déposer le flacon de solution hydro-alcoolique (SHA) sur le piqué jetable avec le sac biorisque ouvert (replié sur lui-même) contenant 2 paires de gants non stériles, 2 lingettes désinfectantes, l'étiquette d'identification du spécimen et un sac de type « Ziploc »;
- Revêtir les ÉPI dans l'ordre : hygiène des mains, blouse à manches longues, masque de procédure, protection oculaire et gants non stériles;
- Laisser le sac vide ouvert, près de la porte (il devient le sac poubelle).

Intervention auprès de l'utilisateur

- Évaluer et intervenir auprès de l'utilisateur;
- Procéder au prélèvement oro-nasopharyngé selon le document : « *AMC-DSIEU-6036 - Test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2* »;
- Déposer le tube de prélèvement :
 - Ne pas le placer sur le piqué jetable;
- Enlever les gants et les jeter dans le sac poubelle;
- Procéder à l'hygiène des mains par friction avec la SHA;
- Enfiler une autre paire de gants contenue dans le sac biorisque;
- Désinfecter le tube de prélèvement avec la lingette désinfectante contenue dans le sac biorisque;
- Jeter la lingette désinfectante dans le sac poubelle;
- Apposer l'étiquette sur le tube de prélèvement;
- Déposer le tube de prélèvement dans le sac biorisque;
- Retirer les gants et la blouse et les jeter dans le sac poubelle;
- Procéder à l'hygiène des mains.

Avant de sortir

- Enfiler la 3^{ème} paire de gants;
- Désinfecter la protection oculaire avec une lingette désinfectante;
- Jeter la lingette-désinfectante dans le sac poubelle;
- Déposer la protection oculaire dans le sac type « Ziploc » et le fermer;
- Retirer vos gants et les jeter dans le sac poubelle;
- Procéder à l'hygiène des mains;
- Enlever le masque de procédure et le jeter dans le sac poubelle;
- Procéder à l'hygiène des mains;
- Aviser l'utilisateur de jeter le sac poubelle dans les déchets de son domicile après votre départ;
- Quitter le domicile en récupérant le flacon de SHA, le sac biorisque contenant le tube de prélèvement et le sac type « Ziploc » contenant votre protection oculaire.

DÉMARCHES LORSQU'UN INTERVENANT EFFECTUE UN SUIVI À DOMICILE

Matériel requis pour soins à l'usager suspecté ou confirmé :

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 bouteille de solution hydro-alcoolique (SHA) | 1 blouse à manches longues |
| 1 masque de procédure | 1 sac poubelle XL |
| 1 protection oculaire | 2 paires de gants non stériles |
| 1 piqué jetable | 1 sac de type « Ziploc » |
| 1 lingette désinfectante | |

En entrant dans le domicile

- Procéder à l'hygiène des mains par friction avec la SHA;
- Frapper à la porte ou sonner, entrer et demander à l'usager et à ses proches de maintenir une distance de 2 mètres avec vous :
 - L'usager et ses proches ne devront plus entrer dans la zone de 2 mètres près de la porte extérieure;
- Déposer le sac contenant les ÉPI au sol près de la porte extérieure (à l'intérieur de la maison);
- Déposer le piqué jetable par terre près de la porte;
- Déposer le flacon de solution hydro-alcoolique (SHA) sur le piqué propre avec une paire de gants non stériles, une lingette désinfectante dans un sac de type « Ziploc »;
- Revêtir les ÉPI dans l'ordre : hygiène des mains, blouse à manches longues, masque de procédure, protection oculaire et gants non stériles;
- Laisser le sac vide ouvert, près de la porte (il devient le sac poubelle).

Intervention auprès de l'usager

- Évaluer et intervenir auprès de l'usager.

Avant de sortir

- Enlever les gants et les jeter dans le sac poubelle;
- Enlever la blouse et la jeter dans le sac poubelle;
- Procéder à l'hygiène des mains;
- Enfiler la 2^{ième} paire de gants;
- Désinfecter la protection oculaire avec une lingette désinfectante;
- Jeter la lingette désinfectante dans le sac poubelle;
- Déposer la protection oculaire dans le sac type « Ziploc » et le fermer;
- Enlever les gants et les jeter dans le sac poubelle;
- Procéder à l'hygiène des mains;
- Enlever le masque et le jeter dans le sac poubelle;
- Aviser l'usager de jeter le sac poubelle dans les déchets de son domicile après votre départ;
- Procéder à l'hygiène des mains;
- Quitter le domicile en récupérant le flacon de SHA et le sac type « Ziploc » contenant votre protection oculaire.