

Tableau synthèse de préparation des usagers pour examens diagnostiques à l’externe
Hôpital Anna-Laberge

EXAMENS	NPO / DIÈTE	MÉDICAMENTS <i>permis le matin de l'examen</i>	ACCÈS IV	LABORATOIRES <i>si non faits, faire les prélèvements manquants la veille</i>	DOCUMENTS <i>à insérer dans l'enveloppe</i>	INFORMATIONS <i>à inscrire sur feuilles de préparation</i>	PRODUIT DE CONTRASTE <i>iode</i>	RASAGE <i>Attention de ne pas couper la peau</i>
CORONAROGRAPHIE	NPO depuis minuit la veille et 2h post-examen Apporter un lunch PRN	- Médication usuelle administrée avant départ y compris les médicaments cardiaques PO, Plavix et ASA (prescriptions au FADM) Sauf : - Lovenox SC - Fragmin SC - Innohep SC - Diurétiques (Lasix, HCTZ, etc.) - Hypoglycémiants et Insuline - Ceux cessés par l'hémodynamicien ou le médecin traitant - Si Héparine IV, poursuivre jusqu'au centre receveur Cesser Coumadin, Pradax, Eliquis, Xarelto 4 jours avant l'examen	Salin lock au bras gauche de calibre 20 ou 18	- FSC - Profil de base - PTPTT - Contrôle de groupe - COVID de moins de 48 heures (sauf Pierre-Boucher) - INR de moins de 24 heures - ECG de moins de 12 heures Spécifique pour coronarographie : Ajout de troponine et le INR doit être égal ou inférieur à 1,5 le jour de l'examen	- Formulaire de la demande d'examen ou d'intervention rempli par le médecin traitant - CLI-60398 Type d'accompagnement lors d'une demande d'examen planifiée - Consultations – Notes d'évolution - Labos (ceux à l'arrivée et les plus récents) - FADM X 2 - Prescriptions de transport - AH-101 Feuille d'admission - Si usager non admis : AH-280 Urgence et consultation - AH-110 Consentement - AH-744 Niveau de soins - CLI-60453 Préparation et notes d'observations examen externe/transfert interétablissement - Requête Octopus Spécifique pour coronarographie : Ajout de résumés d'anciens pontages ou stents OU coronarographies antérieures dansun autre centre receveur	- Poids et taille - Date d'admission - Raison d'hospitalisation - Allergies - Niveau de soins Spécifique pour coronarographie : Préciser les doses de charge (bolus) de Plavix, ASA, Lovenox, Héparine ou TNKase à son arrivée à l'urgence	OUI Si allergie ou insuffisance rénale : Se référer à ordonnance individuelle	Aux 2 aines et au poignet droit au besoin
PACEMAKER – FULGURATION – ÉTUDE ÉLECTROPHYSIOLOGI E (E.E.P.)		- Médication usuelle administrée avant départ (prescriptions au FADM) Sauf : - Diurétiques(Lasix , HCTZ, etc.) - Hypoglycémiants et Insuline - Ceux cessés par l'électrophysiologiste ou le médecin traitant		Spécifique pour stimulateur cardiaque (pacemaker) ou fulguration : Ajout des bandes de rythme en plus de l'ECG	Spécifique pour pacemaker ou fulguration : Ajout de rapport d'écho cardiaque si faite avant le jour de l'examen		NON	Épaule gauche, du thorax jusqu'au mamelon et l'aisselle et aux 2 aines

Tableau synthèse de préparation des usagers pour examens diagnostiques à l’externe
Hôpital Anna-Laberge

EXAMENS	NPO / DIÈTE	MÉDICAMENTS <i>permis le matin de l’examen</i>	ACCÈS IV	LABORATOIRES <i>si non faits, faire les prélèvements manquants la veille</i>	DOCUMENTS <i>à insérer dans l’enveloppe</i>	INFORMATIONS <i>à inscrire sur feuilles de préparation</i>	PRODUIT DE CONTRASTE <i>lode</i>	RASAGE <i>Attention de ne pas couper la peau</i>
FILTRE VEINE CAVE – ANGIOGRAPHIE – ANGIO EMBOLISATION	NPO depuis minuit la veille OU NPO 4 heures avant l’examen (repas léger) si l’intervention est prévue en PM	- Médication usuelle administrée avant départ (prescriptions au FADM) Sauf : - Diurétiques (Lasix, HCTZ, etc.) - Hypoglycémiants et Insuline - Ceux cessés par le radiologiste ou le médecin traitant	Salin lock au bras gauche de calibre 20 ou 18	- FSC - Profil de base - PTPTT - INR de moins de 24 heures - COVID (sauf Pierre-Boucher)	- Formulaire de la demande d’examen ou d’intervention rempli par le médecin traitant - CLI-60398 Type d'accompagnement lors d'une demande d'examen planifiée - Consultations – Notes d’évolution - Labos (ceux à l’arrivée et les plus récents)		OUI Si allergie ou insuffisance rénale : Se référer à ordonnance individuelle	Aux 2 aines jusqu’à mi-cuisse
ÉCHO TRANSOESOPHAGIENNE (ETO)	NPO depuis minuit la veille	Spécifique pour installation de filtre dans la veine cave : Il n’est pas recommandé de cesser les anticoagulants, se référer au médecin traitant Spécifique pour angio : La cessation des anticoagulants sera décidée selon l’état et les ATCD de l’usager, prescrits en ordonnance individuelle par le médecin traitant selon les recommandations du centre receveur Spécifique pour ETO : Ne pas cesser le Coumadin sauf en cas d’avis contraire du médecin traitant	Salin lock au bras droit de calibre 20 ou 18	Spécifique pour installation de filtre dans la veine cave : Ajout de D-Dimères Spécifique pour angio : Ajout de contrôle de groupe et le INR doit être égal ou inférieur à 1,4 le jour de l’examen Spécifique pour ETO : Ajout d’un ECG de moins de 24 heures	- Rapport de tous les examens radiologiques pertinents - FADM - Prescriptions de transport - AH-101 Feuille d’admission - Si usager non admis : - AH-280 Urgence et consultation - AH-110 Consentement - AH-744 Niveau de soins - CLI-60453 Préparation et notes d’observations examen externe/transfert interétablissement - Requête Octopus Spécifique pour ETO : Ajout du rapport d’écho cardiaque si fait avant le jour de l’examen	- Poids et taille - Date d'admission - Raisons d’hospitalisations - Allergies - Niveau de soins	NON	NON

EXAMENS	NPO / DIÈTE	MÉDICAMENTS <i>permis le matin de l’examen</i>	ACCÈS IV	LABORATOIRES <i>si non faits, faire les prélèvements manquants la veille</i>	DOCUMENTS <i>à insérer dans l’enveloppe</i>	INFORMATIONS <i>à inscrire sur feuilles de préparation</i>	PRODUIT DE CONTRASTE <i>lode</i>	RASAGE <i>Attention de ne pas couper la peau</i>
ÉCHO RÉTROGRADE COLLANGIO- PANCRÉATIQUE (ERCP) – ÉCHO ENDOSCOPIQUE	NPO depuis minuit la veille si l’examen est prévu au matin Déjeuner liquide permis avant 8h et pasd’Ensure ni de Boost si l’examen est prévu en après-midi	- Médication usuelle administrée avant départ (prescriptions au FADM) - Sauf : - Lovenox SC - Fragmin SC - Innohep SC - Héparine SC - Diurétiques (Lasix, HCTZ, etc.) - Hypoglycémiants et Insuline - Ceux cessés selon le protocole de préparation du centre receveur ou par le médecin traitant - Si Héparine IV, cesser 4 heures avant l’examen - Cesser antiplaquettaires (Plavix, Brilinta, Effient) 7-10 jours avant l’examen - Cesser Coumadin 5 jours avant l’examen - Cesser anticoagulants (Xarelto, Eliquis, Pradax) 3 jours avant l’examen	Salin lock au bras droit de calibre 20 ou 18	- FSC - Profil de base - PTPTT - INR de moins de 24 heures - COVID Spécifique pour ERCP : Ajout de : - Profil hépatique - AST - Amylase - Lipase - INR doit être égal ou inférieur à 1,5 le jour de l’examen	- Formulaire de la demande d’examen ou d’intervention rempli par le médecin traitant - CLI-60398 Type d’accompagnement lors d’une demande d’examen planifiée - Consultations – Notes d’évolution - Labos (ceux à l’arrivée et les plus récents) - Rapport de tous les examens radiologiques pertinents - FADM - Prescriptions de transport - AH-101 Feuille d’admission - Si usager non admis : AH-280 Urgence et consultation - AH-110 Consentement - AH-744 Niveau de soins - CLI-60453 Préparation et notes d’observations examen externe/transfert interétablissement - Requête Octopus	- Poids et taille - Date d’admission - Raison d’hospitalisation - Allergies - Niveau de soins	NON	NON
ÉCHO BRONCOSCOPIQUE (EBUS)	Ne pas boire et manger 6 heures avant l’examen. Fumeur : Ne pas fumer 4 heures avant l’examen	- Médication usuelle administrée avant départ (prescriptions au FADM). - Anticoagulant à suspendre selon ordonnance individuelle - Sauf : - Diurétiques (Lasix, HCTZ, etc.) - Hypoglycémiants et Insuline	Salin lock de calibre 20 ou 18	Spécifique pour EBUS : Ajout d’un ECG				

Tableau synthèse de préparation des usagers pour examens diagnostiques à l'externe
Hôpital Anna-Laberge

EXAMENS	NPO / DIÈTE	MÉDICAMENTS <i>permis le matin de l'examen</i>	ACCÈS IV	LABORATOIRES <i>si non faits, faire les prélèvements manquants la veille</i>	DOCUMENTS <i>à insérer dans l'enveloppe</i>	INFORMATIONS <i>à inscrire sur feuilles de préparation</i>	PRODUIT DE CONTRASTE <i>lode</i>	RASAGE <i>Attention de ne pas couper la peau</i>
PET SCAN	NPO depuis minuit la veille pour un PET scan régulier NPO depuis 14h la veille pour un PET scan cardiaque • Diète riche en gras et faible en glucides 48 heures Viande <u>seulement</u> (œuf, bacon, poulet, porc, bœuf, poisson, dinde). • Eau permise, pas de jus ni café • Le matin de l'examen, rien qui contient du sucre (gomme, des rafraichisseurs d'haleine ou du sirop pour la toux)	• Médication usuelle administrée avant départ (prescriptions au FADM) Sauf : ◦ Diurétiques (Lasix, HCTZ, etc.) ◦ Ceux cessés par le médecin traitant • Les hypoglycémiants oraux peuvent être administrés 2 heures avant l'examen • Ne pas donner d'insuline SC au moins 6 heures avant l'examen • Ne pas donner de dextrose IV à partir de minuit la veille de l'examen sauf en cas d'hypoglycémie sévère • Anxiolytique pour les usagers claustrophobes	Salin lock de calibre 20 ou 18 Spécifique pour MIBI Persantin: Salin lock du côté gauche	• FSC • Profil de base • COVID • La glycémie capillaire doit être inférieure à 11,1 mmol/L le jour de l'examen et dans les valeurs normales (entre 4,0 et 7,0 mmol/L) durant les 3 jours précédents l'examen	• Formulaire de la demande d'examen ou d'intervention rempli par le médecin traitant • CLI-60398 Type d'accompagnement lors d'une demande d'examen planifiée • Consultations – Notes d'évolution • Labos (ceux à l'arrivée et les plus récents) • Rapport de tous les examens radiologiques pertinents • FADM • Prescriptions de transport • AH-101 Feuille d'admission ◦ Si usager non admis : AH-280 Urgence et consultation • AH-110 Consentement • AH-744 Niveau de soins • CLI-60453 Préparation et notes d'observations examen externe/transfert interétablissement • Requête Octopus Spécifique pour MIBI Persantin : Ajout de rapport d'écho cardiaque et CT scan récent	• Poids et taille • Date d'admission • Raison d'hospitalisation • Allergies • Niveau de soins Spécifique pour MIBI Persantin : Ajout de la date et heure de la dernière dose de caféine	NON	NON
MIBI PERSANTIN	NPO depuis minuit la veille, minimum 4 heures avant l'examen • Thé, café, chocolat, boisson gazeuse et boisson énergétique cessés 30 heures avant l'examen • Prévoir deux repas légers et gras pour la durée de l'examen.	• Aucun médicament permis le matin de l'examen→ apporter ceux-ci durant le transport Sauf : Médication pour le diabète et l'asthme; • Les médicaments contenant de la caféine ou ses dérivés (Théo-SR, Théo-dur, Uniphyll, Fiorinal, Tylenol codéine, Aminophylline, Théophylline, Phyllocontin, Théolair) doivent être cessés 48-72 heures avant l'examen • Enlever timbre de Nitro 12 heures avant l'injection du Persantin		• FSC • Profil de base • Troponine • ECG d'arrivée et un 2^e en cours d'hospitalisation				

Tableau synthèse de préparation des usagers pour examens diagnostiques à l’externe
Hôpital Anna-Laberge

EXAMENS	NPO / DIÈTE	MÉDICAMENTS <i>permis le matin de l'examen</i>	ACCÈS IV	LABORATOIRES <i>si non faits, faire les prélèvements manquants la veille</i>	DOCUMENTS <i>à insérer dans l'enveloppe</i>	INFORMATIONS <i>à inscrire sur feuilles de préparation</i>	PRODUIT DE CONTRASTE <i>lode</i>	RASAGE <i>Attention de ne pas couper la peau</i>
SCINTIGRAPHIE PULMONAIRE (VQ)	NON	Médication usuelle administrée avant départ (prescriptions au FADM)	Salin lock de calibre 20 ou 18	- FSC - Profil de base Spécifique pour scintigraphie pulmonaire : Ajout de D-Dimères et rayon X pulmonaire de moins de 24 heures	- Formulaire de la demande d'examen ou d'intervention rempli par le médecin traitant - CLI-60398 Type d'accompagnement lors d'une demande d'examen planifiée - Consultations – Notes d'évolution - Labos (ceux à l'arrivée et les plus récents) - Rapport de tous les examens radiologiques pertinents - FADM - Prescriptions de transport - AH-101 Feuille d'admission - Si usager non admis : AH-280 Urgence et consultation - AH-110 Consentement - AH-744 Niveau de soins - CLI-60453 Préparation et notes d'observations examen externe/transfert interétablissement - Requête Octopus Spécifique pour scintigraphie pulmonaire : Ajout de rapport de rayon X pulmonaire de moins de 24 heures	- Poids et taille - Date d'admission - Raison d'hospitalisation - Allergies - Niveau de soins	NON	NON
SCINTIGRAPHIE OSSEUSE ET/OU AU GALIUM								
CATHÉTER DE DIALYSE	NON Déjeuner ou dîner léger selon l'heure du rendez-vous	- Médication usuelle administrée avant départ (prescriptions au FADM) Sauf : - Diurétiques (Lasix, HCTZ, etc.) - Ceux cessés par le médecin traitant - Anticoagulants à voir avec le médecin	Salin lock de calibre 20 ou 18	- FSC - Profil rénal - INR - PTPTT	- Formulaire de la demande d'examen ou d'intervention rempli par le médecin traitant - CLI-60398 Type d'accompagnement lors d'une demande d'examen planifiée - Consultations – Notes d'évolution - Labos (ceux à l'arrivée et les plus récents) - Rapport de tous les examens radiologiques pertinents - FADM - Prescriptions de transport - AH-101 Feuille d'admission - Si usager non admis : AH-280 Urgence et consultation - AH-110 Consentement - AH-744 Niveau de soins - CLI-60453 Préparation et notes d'observations examen externe/transfert interétablissement - Requête Octopus	- Poids et taille - Date d'admission - Raison d'hospitalisation - Allergies - Niveau de soins - Fonctions rénales - Horaire de dialyse	NON Sauf : Lorsque la veine profonde semble obstruée Si allergie ou insuffisance rénale : Se référer à ordonnance individuelle	Épaule droite, du thorax jusqu'au mamelon et l'aisselle