

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Signes vitaux pédiatriques normaux selon l'âge

Groupe d'âge	Respiration	Pouls (éveil)	Pouls (Sommeil)	TAS	TAD
1 à 30 jours	30 à 60/min	100 à 205/min	90 à 160/min	67 à 84 mmHg	35 à 53 mmHg
1 à 12 mois	30 à 53/min	100 à 180/min	90 à 160/min	72 à 104 mmHg	37 à 56 mmHg
1 à 2 ans	22 à 37/min	98 à 140/min	80 à 120/min	86 à 106 mmHg	42 à 63 mmHg
3 à 5 ans	20 à 28/min	80 à 120/min	65 à 100/min	89 à 112 mmHg	46 à 72 mmHg
6 à 9 ans	18 à 25/min	75 à 118/min	58 à 90/min	97 à 115 mmHg	57 à 76 mmHg
10 à 12 ans	16 à 20/min	60 à 100/min	50 à 90/min	102 à 120 mmHg	61 à 80 mmHg
12 à 15 ans	12 à 20/min	60 à 100/min	50 à 90/min	110 à 131 mmHg	64 à 83 mmHg

**** Pour les enfants de plus 1 an, la tension artérielle (TA) minimale peut être estimée à partir de la règle suivante : $70 + (2 \times \text{âge en année})$ ****

Code de couleur selon le poids

 Gris : 3 à 5 Kg	 Mauve : 10 à 11 Kg	 Bleu : 19 à 23 Kg
 Rose : 6 à 7 Kg	 Jaune : 12 à 14 Kg	 Orange : 24 à 29 Kg
 Rouge : 8 à 9 Kg	 Blanc : 15 à 18 Kg	 Vert : 30 à 36 Kg

Références : Hazinski, F.M. (2012). *Nursing Care of the Critically Ill Child*. 3e éd. Mosby: 1-18, Elsevier

Direction émettrice : Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire

Entrée en vigueur :

2023-02-17

AMC-DSIEU-6139 (2023-02)

Révision :