

Traitement d'urgence de l'hypoglycémie sévère chez la personne inconsciente - Glucagon intranasal (Baqsimi)

INDICATION

Le glucagon intranasal (Baqsimi) est indiqué dans le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 4 ans et plus ayant un diabète.

PRÉCAUTION

- Conserver le glucagon intranasal (Baqsimi) dans le récipient scellé avec pellicule plastique jusqu'à l'emploi.
- Ne pas retirer le film plastique rouge du récipient et ne pas ouvrir le tube avant d'être prêt à l'utilisation.
→ *Si le tube a été ouvert, le médicament peut avoir été exposé à l'humidité et pourrait ne pas fonctionner comme prévu.*
- Ne pas appuyer sur le piston avant d'être prêt à administrer la dose.
→ *Sinon, la dose unique du dispositif sera perdue.*

ADMINISTRATION

Étape préalable

Tirer sur la bande rouge pour retirer la pellicule plastique, ouvrir le couvercle et retirer le dispositif du récipient.




1. Tenir le récipient unidose comme montré sur l'image.

N'appuyer pas sur le piston avant l'insertion dans la narine.



2. Insérer l'embout dans l'une des narines jusqu'à ce que les doigts touchent l'extérieur du nez.



3. Utiliser votre pouce pour enfoncer complètement le piston jusqu'à ce que la ligne verte ne soit plus visible.

Dose complète est administré lorsque la ligne verte n'est plus visible.



APRÈS L'ADMINISTRATION DE LA DOSE

- Retirer l'embout du nez et jeter le dispositif.
- Si la personne en hypoglycémie est inconsciente :
 - Tourner l'usager sur le côté après avoir administré le glucagon intranasal (Baqsimi).
 - Suivre les directives de l'OC-6067 *Traiter l'hypoglycémie chez la clientèle de 14 ans et plus* **OU** les directives du professionnel habileté.