

Cet aide-mémoire regroupe les principes généraux d'asepsie cutanée. Il est important de tenir compte des facteurs intrinsèques des usagers (ex. : âge, hypersensibilité ou allergie) dans le choix de l'antiseptique.

	Glycémie capillaire	Injections SC, IM, etc.	Ponction veineuse		Hémoculture		Installation DAVPC ¹ ou DASC ²		Prélèvement via DAVC ³ et canule artérielle <i>Friction 30 sec.</i>	Installation et entretien au site du DAVC ³ ou canule artérielle		Installation sonde urinaire ou cathétérisme vésical		Analyse et culture d'urine	
Choix antiseptique	Toute clientèle	Toute clientèle	**Clientèle néonatale	Autre clientèle	**Clientèle néonatale	Autre clientèle	**Clientèle néonatale	Autre clientèle	Toute clientèle	**Clientèle néonatale	Autre clientèle	**Clientèle néonatale	Autre clientèle	Porteur de sonde	Autre clientèle
Alcool 70%			2 ^e choix (Triple asepsie)		4 ^e choix (Triple asepsie) à 2 reprises		3 ^e choix (Triple asepsie)								
Chlorhexidine 0,5% + alcool 70%			1 ^{er} choix		1 ^{er} choix (Double asepsie)		1 ^{er} choix			1 ^{er} choix					
Chlorhexidine 2% + alcool 70%				1 ^{er} choix		1 ^{er} choix (Double asepsie)		1 ^{er} choix			1 ^{er} choix				
Chlorhexidine 0,05% aqueuse			4 ^e choix		3 ^e choix (Double asepsie)		4 ^e choix			3 ^e choix	2 ^e choix	3 ^e choix			
Chlorhexidine 2%										2 ^e choix		2 ^e choix			
Providine iodée 10%			3 ^e choix		2 ^e choix (Double asepsie)		2 ^e choix			2 ^e choix	4 ^e choix	1 ^{er} choix			
Autre	*Milieu communautaire													1 ^{er} choix	2 ^e choix

1. DAVPC Dispositif accès veineux périphérique court 2. DASC Dispositif accès sous-cutané 3. DAVC Dispositif accès veineux central *L'asepsie peut différer **Clientèle néonatale moins de 30 jours.									Techniques d'application	
Légende	Bouteille	Eau et savon	Tampon	Lingette antiseptique de chlorure de benzalkonium	Tige	Sachet	Double asepsie	Triple asepsie	Chlorhexidine alcoolisée	Providine ou solution aqueuse
							Usage de 2 tampons (laisser sécher entre chaque tampon)	Usage de 3 tampons (laisser sécher entre chaque tampon)	Friction mouvement de vas et vient Durée de la friction de 30 secondes Laisser sécher 90 à 120 secondes	Friction mouvement circulaire du centre vers la périphérie Durée de la friction de 30 secondes Laisser sécher 90 à 120 secondes
⇒ L'intervenant doit procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et savon avant toute asepsie cutanée. ⇒ Le port des gants est obligatoire si risque d'exposition aux liquides biologiques. ⇒ TOUJOURS prioriser le 1^{er} choix. En cas de situation d'hypersensibilité, d'allergie OU d'indisponibilité de la solution au 1^{er} choix, passez aux choix subséquents. ⇒ Le nettoyage de la peau visiblement souillée doit être effectué avant toute désinfection (eau et savon OU NaCl 0,9% OU eau stérile). La peau doit être sèche avant de procéder à la désinfection. Le nombre de tige ou de tampons requis doit être ajusté selon la superficie de la région à aseptiser, et le temps de séchage peut varier. ⇒ Porteur de DAV aux soins intensifs ET porteurs de bactéries multirésistantes (BMR) : offrir un bain DIE avec une solution de Chlorhexidine pour tous les usagers âgés de 2 mois et plus.									Le temps de séchage est extrêmement important pour TOUS les antiseptiques utilisés. IL NE FAUT PAS ESSUYER NI NETTOYER APRÈS L'APPLICATION.	