





AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Stomies intestinales et urinaires

STOMIES INTESTINALES ET URINAIRES	
Dimension	• <i>Ronde ou ovale</i> : mesurée à l'aide d'un gabarit • <i>Ovale ou irrégulière</i> : mesurée à l'aide d'un ruban gradué ○ Longueur (1) : distance entre les 2 points les plus éloignés de la stomie ○ Largeur (2) : distance de l'axe le plus long qui coupe perpendiculairement la longueur   ○ D'une feuille plastifiée transparente où sont tracés les contours de la stomie   Note : Les dimensions varient au cours des 6 à 8 premières semaines en raison de la diminution graduelle de l'œdème postopératoire
Coloration	• <i>Rosée à rouge</i> : normale • <i>Bleutée ou violacée</i> : signe d'hypoxie systémique ou d'ecchymose • <i>Grise/noire</i> : signe d'ischémie/nécrose
Forme	• Ronde • Ovale • Irrégulière • Avec ou sans tige de soutien (tige souple, rigide, suturée ou non)
Protrusion	Normale : • Iléostomie : minimalement 2 cm • Colostomie : minimalement 1 cm À fleur de peau : au même niveau que la peau Rétractée : sous le niveau de la peau Prolapsus : supérieure à 5 cm 
Aspect	Récemment créée : luisante et humide, peut être œdématiée Mature : plus texturée (plis et creux visibles), luisante et humide
Jonction muco-cutanée	Normale : aucun espace entre la muqueuse de la stomie et la peau péristomiale ○ Période postopératoire : présence de sutures résorbables Anormale : espace inhabituel sur une partie ou la totalité de la jonction (déhiscence), présence de granulome (voir Complications)

PEAU PÉRISTOMIALE	
Intégrité	• Intacte, sans lésion • Macérée • Excoriée (abrasion) • Sèche • Présence d'éruptions, d'ulcérations, de plaies
Couleur	Même coloration que la peau de l'abdomen de l'usager Modification de la coloration de la peau • <i>Peau de teinte pâle</i> : rougeur (érythème) • <i>Peau de teinte foncée</i> : rougeur ou coloration violacée, grisâtre, brune ou noire (plus foncée que le reste de la peau)
Aspect	• Aspect/texture comparable au reste de la peau de l'abdomen • Œdème • Chaleur • Présence d'incisions, de plaies, de creux ou de plis pouvant nuire à l'uniformité de la peau péristomiale

COMPLICATIONS	
Cliquer sur la complication pour avoir accès à la MSI	
Stomie :	• Déhiscence muco-cutanée • Nécrose • Traumatisme avec saignement • Stomie rétractée • Hernie péristomiale • Sténose • Prolapsus • Lacération • Ecchymose
Peau péristomiale :	• Dermatite péristomiale liée à l'humidité • Lésions pseudo-verruqueuses • Lésions cutanées associées aux adhésifs médicaux (LCAAM) • Dermatite allergique • Folliculite • Infection fongique • Lésion de pression • Varice péristomiale • Pyoderma gangrenosum • Granulome • Fistule péristomiale • Transplantation des muqueuses

CONDUIT ILÉAL (UROSTOMIE)	
Caractéristiques de l'urine (Normale)	• Couleur ambrée • Claire • Dépôt de mucus • Odeur forte
Alerte clinique <i>Référer rapidement au médecin si une infection est suspectée, car le conduit iléal est directement relié au rein.</i>	Signes et symptômes d'infection urinaire : • Odeur accentuée de l'urine • Urine trouble • Présence de sang dans l'urine • Douleur au flanc • Fièvre 
Formation de cristaux	• Petits dépôts blancs, calcaires ou cristallins sur la stomie et la peau péristomiale ○ accompagnés de douleur locale • Peut être causée par : ○ une urine alcaline (pH plus grand que 5,5) ○ une hydratation insuffisante ○ une ouverture trop grande de la barrière cutanée

Références : Méthodes de soins informatisés MSI. (2022). Évaluation des stomies intestinales et de la peau péristomiale et gestion des complications. Centre d'expertise en santé de Sherbrooke CESS. <https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/evaluation-des-stomies-intestinales-et-de-la-peau-peristomiale-et-gestion-des-complications>
Méthodes de soins informatisés MSI. (2022). Soins de la stomie urinaire et de la peau péristomiale. Centre d'expertise en santé de Sherbrooke CESS. <https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/soins-de-la-stomie-urinaire-et-de-la-peau-peristomiale>
Méthodes de soins informatisés MSI. (2022). Cadre de référence sur les soins des stomies urinaires. Centre d'expertise en santé de Sherbrooke CESS. <https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/cadre-de-referance-sur-les-soins-des-stomies-urinaires>

Direction émettrice : Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Entrée en vigueur : 2025-05-07
AMC-DSIEU-6171 (2025-05)	Révision :