

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Liste des antidotes disponibles au CISSS Montérégie Ouest

Antidotes en ordre alphabétique	Quantité minimale suggérée par l'hôpital	Quantité Urgence HAL	Quantité Urgence HBM	Quantité Urgence Suroît	Pharmacie HAL	Pharmacie Suroît	Indication	Délai acceptable
N-acétylcystéine (Mucomyst) 200 mg/mL Fiole 30 mL	8 fioles de 6 g Total 48 g	Observation Cabinet (30 fioles) Salle à choc Chariot (10 fioles) Disponible dans plusieurs cabinets	Cabinet (30 fioles) Disponible dans plusieurs cabinets	Observation Cabinet (30 fioles) Disponible dans plusieurs cabinets	Réserve	Carrousel Réserve	Surdosage/intoxication à l' acétaminophène	Inférieur à 1 heure
Acide Folique 5 mg/mL Fiole 10 mL	17 fioles de 50 mg Total 840 mg	Armoire intox. (17 fioles)	Cabinet (17 fioles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (4 fioles) Observation Cabinet (13 fioles)	Réserve	Carrousel	Intoxication au méthanol (adjuvant)	Immédiat
Anticorps spécifiques à la digoxine (DigiFab) Conserver au frigo	20 fioles de 40 mg Total 800 mg	FRIGO (10 fioles)	FRIGO (10 fioles)	Salle de Trauma FRIGO (10 fioles)	Réserve FRIGO	Carrousel FRIGO	Surdosage/intoxication à la digoxine ou à d'autres substances contenant des glycosides cardiaques	Immédiat
Atropine Ampoule 0,4 mg/mL Ampoules 1 mL OU 0,1 mg/mL Seringue 10 mL	250 ampoules de 0,4 mg OU 100 seringues de 1 mg Total 100 mg	Armoire intox. (30 ampoules de 0,6 mg) Salle à choc Chariot (10 seringues) Actif Cabinet (18 seringues) Disponible dans plusieurs cabinets	Cabinet (20 ampoules) CCU Cabinet (20 ampoules) Cabinet (12 seringues) CCU Cabinet (6 seringues)	Observation Cabinet (10 ampoules) Disponible dans plusieurs cabinets Salle de Trauma COMMUN (10 seringues) Disponible dans plusieurs cabinets	Réserve	Carrousel Réserve	Intoxication aux organophosphorés, carbamates, insecticides, parasymphomimétiques	Immédiat

Références : : 1) Dart RC, goldfrank LR, Erstad BL, Huang DT, Todd KH, Weitz J, Bebart VS, Caravati EM, Henretig FM, Delbridge TR, Banner W, Schneider SM, Anderson VE. Expert consensus Guidelines for Stocking of Antidotes in Hospitals That Provide Emergency Care. Ann Emerg Med. 2018 Mar;71(3) :314-325.e1. 2) Recommandations de stockage des antidotes en établissements de santé [En ligne]. Québec : centre antipoison du Québec ; 2017 [cité le 02-2021]. Disponible : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/toxicologie-clinique/Antidotes/resume_antidotes.pdf 3) Guide Canadien des antidotes en toxicologie d'urgence [En ligne]. Association canadienne des centres antipoison ; 2018 [cité le 2 janvier 2019]. Disponible : [Antidotes | CIUSSSCN \(gouv.qc.ca\)](#)

AMC-DSPem-6029 (Rév. 2025-04)

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Liste des antidotes disponibles au CISSS Montérégie Ouest

Antidotes en ordre alphabétique	Quantité minimale suggérée par l'hôpital	Quantité Urgence HAL	Quantité Urgence HBM	Quantité Urgence Suroît	Pharmacie HAL	Pharmacie Suroît	Indication	Délai acceptable
Barbituriques (phénobarbital) 30 mg/mL Ampoules 1 mL OU 120 mg/mL Ampoules 1 mL	93 ampoules de 30 mg OU 23 ampoules de 120 mg Total 2800 mg	Chirurgie ouest Cabinet (10 ampoules) Disponible dans plusieurs cabinets Cabinet (10 ampoules) Disponible dans plusieurs cabinets	Nil Cabinet (10 ampoules) 3 ^e étage Cabinet (10 ampoules)	Observation Cabinet (5 ampoules) Observation Cabinet (15 ampoules) Disponible dans plusieurs cabinets	Voute à narcotiques	Voute à narcotiques	Convulsions et/ou <i>status epilepticus</i> d'origine toxicologique réfractaire aux benzodiazépines chez l'utilisateur préférablement intubé	Immédiat
Bicarbonate de sodium 8,4% 1 mmol/mL Fiole 50 mL OU Seringue 50 mL	10 fioles ou seringues de 50 mL Total 500 mmol	Cabinet (12 fioles) Salle à choc Chariot (12 seringues) Disponible dans plusieurs cabinets	Cabinet (12 seringues) Disponible dans plusieurs cabinets	Salle de Trauma COMMUN (10 seringues) Disponible dans plusieurs cabinets	Réserve	Carrousel Réserve	Cardiotoxicité secondaire aux antidépresseurs tricycliques et antiarythmiques de classe Ia ou Ic, acidose métabolique, alcalinisation de l'urine lors d'intoxication aux salicylates	Immédiat
Bleu de méthylène 10 mg/mL Fiole 5 mL	10 fioles de 50 mg Total 500 mg	Armoire intox. (10 fioles) Salle de réveil Cabinet (10 fioles)	Cabinet (5 fioles) Bloc opératoire (5 fioles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (10 fioles) Bloc opératoire (3 fioles)	Réserve	Carrousel	Méthémoglobinémie , choc réfractaire relié à la prise d'une toxine ou prophylaxie de l'encéphalopathie secondaire à l' ifosfamide	Immédiat
Bromocriptine (Parlodel) Comprimé 2,5 mg	16 comprimés de 2,5 mg Total 40 mg	Armoire intox. (16 comprimés) Actif Cabinet (10 comprimés)	Cabinet (20 comprimés)	Observation Cabinet (20 comprimés)	Réserve	Ensacheuse Réserve	Syndrome neuroleptique malin	Inférieur à 1 heure

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Liste des antidotes disponibles au CISSS Montérégie Ouest

Antidotes en ordre alphabétique	Quantité <u>minimale</u> suggérée par l'hôpital	Quantité Urgence HAL	Quantité Urgence HBM	Quantité Urgence Suroît	Pharmacie HAL	Pharmacie Suroît	Indication	Délai acceptable
Calcium, chlorure 100 mg/mL Fiole 10 mL	20 fioles de 1 g Total 20 g	Armoire intox. (10 fioles)	Cabinet (12 fioles) CCU Cabinet (8 fioles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (4 fioles) Observation Cabinet (16 fioles)	Réserve	Carrousel	Intoxication aux bloqueurs des canaux calciques ou traitement de l'hypocalcémie secondaire à l' acide fluorhydrique ou aux sels solubles de fluorure et de bifluorure	Immédiat
Calcium, gluconate 100 mg/mL Fiole 10 mL	20 fioles de 1 g Total 20 g	Armoire intox. (25 fioles) Salle à choc Chariot (10 fioles) Char à code Disponible dans plusieurs cabinets	Cabinet (10 fioles) Char à code Bloc opératoire CCU Cabinet	Salle de Trauma Cabaret antidotes (20 fioles) et COMMUN (10 fioles) Char à code Bloc opératoire Disponible dans plusieurs cabinets	Réserve	Carrousel SCAS	Intoxication aux bloqueurs des canaux calciques ou traitement de l'hypocalcémie secondaire à l' acide fluorhydrique ou aux sels solubles de fluorure et de bifluorure	Immédiat
Calcium, gluconate, gel topique 2,5% Pot 50 g	Au moins 1 format équivalent à 50 g de gel topique Total 50 g	Armoire intox. (2 pots)	Nil Voir Suroît	Salle de Trauma Cabaret antidotes (10 pots)		Nil	Exposition cutanée à l' acide fluorhydrique	Immédiat
Charbon active solution aqueuse 222 mg/mL Bouteille 225 mL	 Total 300 g	COMMUN (7 bouteilles) Chirurgie ouest Cabinet (2 bouteilles) Soins intensifs Cabinet (3 bouteilles)	Cabinet (6 bouteilles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (2 bouteilles) Observation Cabinet (4 bouteilles)	Réserve	Carrousel	Décontamination gastro-intestinale	Immédiat

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Liste des antidotes disponibles au CISSS Montérégie Ouest

Antidotes en ordre alphabétique	Quantité minimale suggérée par l'hôpital	Quantité Urgence HAL	Quantité Urgence HBM	Quantité Urgence Suroît	Pharmacie HAL	Pharmacie Suroît	Indication	Délai acceptable
Cyproheptadine (Periactin) Comprimé 4 mg	8 comprimés de 4 mg Total 32 mg	Armoire intox. (8 comprimés) Actif Cabinet (10 comprimés)	Cabinet (10 comprimés)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (8 comprimés) Observation Cabinet (10 comprimés)	Réserve	Ensacheuse Réserve	Syndrome sérotoninergique	Inférieur à 1 heure
Dantrolène (Dantrium) Fiole poudre inj. 20 mg	36 fioles de 20 mg Total 720 mg	Armoire intox. (18 fioles) Bloc opératoire (18 fioles)	Cabinet (18 fioles) Bloc opératoire (18 fioles)	Observation Cabinet (18 fioles) Bloc opératoire (18 fioles)	Réserve (fiole et caps)	Carrousel Réserve	Hyperthermie maligne	Immédiat
Déféroxamine (Desferal) Fiole 500 mg	12 fioles de 500 mg Total 6 g	Armoire intox. (10 fioles)	Nil Voir Suroît	Salle de Trauma Cabaret antidotes (12 fioles)	Réserve	Carrousel	Intoxication au fer	Inférieur à 1 heure
Dextrose 50 %, 25 g/50 mL Fiole 50 mL OU Seringue 50 mL	34 fioles ou seringues de 25 g Total 840 g	Cabinet (6 seringues) Salle à choc Chariot (10 seringues) Disponible dans tous les cabinets	Cabinet (12 seringues)	Salle de Trauma COMMUN (10 seringues) Disponible dans tous les cabinets	Réserve	Carrousel Réserve	Surdosage/intoxication aux bloqueurs des canaux calciques/bloqueurs adrénergiques conjointement avec insuline ou traitement de l'hypoglycémie	Immédiat
Diazépam (Valium) 5 mg/mL Ampoule 2 mL	28 ampoules de 10 mg Total 280 mg	Cabinet (20 ampoules) Disponible dans tous les cabinets	Cabinet (10 ampoules) Disponible dans tous les cabinets	Observation cabinet (10 ampoules) Disponible dans tous les cabinets	Voute à narcotiques	Voute à narcotiques	Traitement de support pour les syndromes sympathomimétique, sérotoninergique ou neuroleptique malin, agitation, hypertonie ou convulsions d'origine toxicologique	Immédiat
Diphenhydramine (Benadryl) 50 mg/mL Fiole 1 mL	8 fioles de 50 mg Total 400 mg	Cabinet (50 fioles) Disponible dans tous les cabinets	Cabinet (24 fioles) Disponible dans tous les cabinets	Observation Cabinet (25 fioles) Disponible dans tous les cabinets	Réserve	Carrousel Réserve	Réaction extrapyramidales, akathisies induites par des médicaments ou symptomatologie histaminique	Immédiat

Références : 1) Dart RC, goldfrank LR, Erstad BL, Huang DT, Todd KH, Weitz J, Bebarta VS, Caravati EM, Henretig FM, Delbridge TR, Banner W, Schneider SM, Anderson VE. Expert consensus Guidelines for Stocking of Antidotes in Hospitals That Provide Emergency Care. Ann Emerg Med. 2018 Mar;71(3) :314-325.e1. 2) Recommandations de stockage des antidotes en établissements de santé [En ligne]. Québec : centre antipoison du Québec ; 2017 [cité le 02-2021]. Disponible : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/toxicologie-clinique/Antidotes/resume_antidotes.pdf 3) Guide Canadien des antidotes en toxicologie d'urgence [En ligne]. Association canadienne des centres antipoison ; 2018 [cité le 2 janvier 2019]. Disponible : [Antidotes | CIUSSSCN \(gouv.qc.ca\)](https://www.ccsa.ca/fr/antidotes)

Direction émettrice : Direction des services professionnels et de l'enseignement médical	Entrée en vigueur :	2022-07-08
AMC-DSPem-6029 (Rév. 2025-04)	Révision :	2025-03-28

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Liste des antidotes disponibles au CISSS Montérégie Ouest

Antidotes en ordre alphabétique	Quantité minimale suggérée par l'hôpital	Quantité Urgence HAL	Quantité Urgence HBM	Quantité Urgence Suroît	Pharmacie HAL	Pharmacie Suroît	Indication	Délai acceptable
EDTA calcique 50 mg/mL Ampoule 10 mL Produit par Serb (+33 (0) 1 73 03 20 00)	10 ampoules de 0,5 g Total 5 g P.A.S.	Nil Voir Suroît	Nil Voir Suroît	Salle Trauma Cabaret antidotes (10 ampoules)	Nil Voir Suroît	Nil Demande P.A.S. avant péréemption ou si utilisation	Intoxication au plomb, zinc, manganèse ou radio- isotopes lourds	Inférieur à 6 heures
Émulsion lipidique (Intralipid) 20% Sac 500 mL	2 sacs de 500 mL Total 1000 mL	Salle à choc Chariot (1 sac) Salle de réveil Cabinet (2 sacs)	COMMUN (2 sacs) Bloc opératoire (4 sacs)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (1 sac) Bloc opératoire (4 sacs)	Réserve	Carrousel Réserve Commun CME	Surdosage/intoxication aux anesthésiques locaux	Immédiat
Flumazénil (Anexate) 0,1 mg/mL Fiole de 5 mL	20 fioles de 0,5 mg Total 10 mg	Cabinet (20 fioles) Salle à choc Chariot (10 fioles) Salle de réveil Cabinet (10 fioles)	Cabinet (10 fioles) CCU Cabinet (10 fioles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (10 fioles) Salle de Trauma COMMUN (10 fioles)	Réserve	Carrousel Réserve	Surdosage/intoxication aux benzodiazépines	Immédiat
Fomépizole (Antizol) 1 g/mL Trousse de 4 fioles Fiole 1,5 mL	4 fioles de 1,5 g Total 6 g	Armoire intox. (4 fioles)	Cabinet (4 fioles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (4 fioles)	Réserve	Carrousel	Intoxication au méthanol et/ou éthylène glycol	Inférieur à 1 heure
Hydroxocobalamine (Cyanokit) Trousse de 2 fioles Fiole poudre inj. 5 g	2 fioles de 5 g Total 10 g (2 troussees)	Armoire intox. (2 fioles)	Cabinet (2 fioles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (1 fiole) Observation+UDC Cabinets (4 fioles total)	Réserve	Réserve	Intoxication aiguë aux sels de cyanure, acétonirile, propionitrile, amygdaline, ou à l'acide cyanhydrique et/ou toxicité associée au nitroprussiate de sodium	Immédiat

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Liste des antidotes disponibles au CISSS Montérégie Ouest

Antidotes en ordre alphabétique	Quantité minimale suggérée par l'hôpital	Quantité Urgence HAL	Quantité Urgence HBM	Quantité Urgence Suroît	Pharmacie HAL	Pharmacie Suroît	Indication	Délai acceptable
Idarucizumab (Praxbind) 50 mg/mL Trousse 2 fioles 50 mL Conserver au frigo	2 fioles de 2,5 g Total 5 g	FRIGO (2 fioles)	FRIGO (2 fioles)	Salle de Trauma FRIGO (2 fioles)	Réserve FRIGO	Carrousel FRIGO	Renversement du dabigatran Utiliser OIPI-604 pour prescrire	Immédiat
Idarucizumab (Praxbind) 50 mg/mL Trousse 2 fioles 50 mL Conserver au frigo	2 fioles de 2,5 g Total 5 g	FRIGO (2 fioles)	FRIGO (2 fioles)	Salle de Trauma FRIGO (2 fioles)	Réserve FRIGO	Carrousel FRIGO	Renversement du dabigatran Utiliser OIPI-604 pour prescrire	Immédiat
Insuline régulière (Humulin R) 100 unités/mL Fiole 10 mL, OU Stylo 3 mL Conserver au frigo	2 fioles de 1000 unités Total 2000 unités	FRIGO (8 fioles) Disponible dans tous les FRIGOS	FRIGO (2 fioles) Disponible dans tous les FRIGOS	Observation FRIGO (4 fioles) Disponible dans tous les FRIGOS	Réserve FRIGO	Carrousel FRIGO Réserve FRIGO	Surdosage/intoxication aux bloqueurs des canaux calciques et/ou bêta-bloquants	Immédiat
Leucovorin (Acide Folinique) 10 mg/mL Fiole 50 mL Conserver au frigo	2 fioles de 500 mg Total de 800 mg	FRIGO (1 fiole)	FRIGO (2 fioles)	Salle de Trauma FRIGO (5 fioles) Satellite oncologie	Réserve FRIGO	Carrousel FRIGO	Surdosage/intoxication aux antagonistes et d'acide folique et adjuvant dans l'intoxication au méthanol	Immédiat
Levocarnitine (Carnitor) 200 mg/mL Fiole 5 mL Total 12 g	12 fioles de 1 g Total 12 g	Armoire intox. (6 fioles) Chirurgie ouest Cabinet (6 fioles)	Cabinet (12 fioles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (12 fioles)	Réserve	Carrousel	Surdosage/intoxication à l' acide valproïque	Inférieur à 1 heure

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Liste des antidotes disponibles au CISSS Montérégie Ouest

Antidotes en ordre alphabétique	Quantité minimale suggérée par l'hôpital	Quantité Urgence HAL	Quantité Urgence HBM	Quantité Urgence Suroît	Pharmacie HAL	Pharmacie Suroît	Indication	Délai acceptable
Naloxone (Narcan) 0,4 mg/mL Ampoule 1 mL OU 1 mg/mL Fiole 2 mL	75 ampoules de 0,4 mg OU 15 fioles de 2 mg Total 30 mg	Cabinet (50 ampoules) Salle à choc Chariot (20 ampoules) Disponible dans tous les cabinets Actif Cabinet (10 fioles) Soins intensifs Cabinet (10 fioles)	Cabinet (20 ampoules) Disponible dans tous les cabinets Cabinet (10 fioles) Soins intensifs Cabinet (10 fioles)	Salle de trauma COMMUN (20 ampoules) Disponible dans tous les cabinets Observation Cabinet (10 fioles) Soins intensifs Cabinet (10 fioles)	Réserve	Carrousel Réserve	Intoxication aux opioïdes	Immédiat
Octréotide (Sandostatin) 100 mcg/mL Fiole 1 mL OU 500 mcg/mL Fiole 1 mL Conserver au frigo	15 fioles de 100 mcg OU 3 fioles de 500 mcg Total 1500 mcg	FRIGO (5 fioles) Disponible dans plusieurs FRIGOS FRIGO (5 fioles) Disponible dans plusieurs FRIGOS	FRIGO (20 fioles) 3 ^e étage FRIGO Nil	Observation FRIGO (10 fioles) Disponible dans plusieurs FRIGOS Salle de trauma FRIGO (5 fioles) Soins intensifs FRIGO (5 fioles)	Réserve FRIGO	Carrousel FRIGO Réserve FRIGO	Surdosage/intoxication aux sulfonylurées, méglitinide ou à la quinine	Inférieur à 1 heure

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Liste des antidotes disponibles au CISSS Montérégie Ouest

Antidotes en ordre alphabétique	Quantité minimale suggérée par l'hôpital	Quantité Urgence HAL	Quantité Urgence HBM	Quantité Urgence Suroît	Pharmacie HAL	Pharmacie Suroît	Indication	Délai acceptable
Olanzapine à dissolution orale (Zyprexa Zydis) Comprimé dissolution orale 5 mg ou 10 mg	6 comprimés de 10 mg Total 60 mg	Cabinet (30 co. 5 mg et 20 co.10 mg) Salle à choc Chariot (10 co. 5 mg) Soins intensifs Cabinet	Cabinet (10 co.10 mg) 3 ^e étage Cabinet	Observation Cabinet (20 co.10 mg) Psychiatrie Cabinet	Réserve	Carrousel Réserve	Syndrome sérotoninergique	Immédiat
Pénicillamine (Cuprimine) Capsule 250 mg	8 capsules de 250 mg Total 2 g	Armoire intox. 1 pot (100 caps.)	Nil Voir HAL	Nil Voir HAL	Nil	Nil	Intoxication chronique au plomb	Inférieur à 2 heures
Phentolamine (Rogitine) 5 mg/mL Fiole 1 mL Conserver au frigo	20 fioles de 5 mg Total 100 mg	FRIGO (10 fioles)	FRIGO (10 fioles)	Observation FRIGO (20 fioles)	Réserve FRIGO	Carrousel FRIGO	Surdosage/intoxication aux drogues stimulantes (amphétamine, cocaïne, éphédrine) ou extravasation d'agents vasoconstricteurs (épinéphrine, norépinéphrine, dopamine)	Immédiat
Physostigmine (Antilirium) 0,4 mg/mL Ampoule 5 mL Produit par Akorn Inc.	5 ampoules de 2 mg Total 10 mg P.A.S.	Armoire intox. (10 ampoules)	Cabinet (5 ampoules)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (5 ampoules)	Nil Demande P.A.S. avant péréemption ou si utilisation	Nil Demande P.A.S. avant péréemption ou si utilisation	Surdosage/intoxication aux anticholinergiques	Immédiat
Polyéthylène glycol avec électrolytes (PegLyte, Golytely) Solution orale 4 L	9 formats de 4 L Total 36 L	Cabinet (4 x 4 L) Disponible dans plusieurs cabinets	COMMUN (1 x 4L) Cabinet (1 x 4 L)	Observation COMMUN (1 x 4 L) Cabinet (1 x 4 L)	Réserve	Carrousel Réserve	Irrigation intestinale totale pour : - Ingestion potentiellement toxique de substance non absorbable par le charbon activé - Ingestion d'une substance pouvant former des amas ou des bézoards - Ingestion d'un corps étranger toxique non coupant	Immédiat
Pralidoxine (Protopam) Poudre injectable 1 g Produit par Baxter Canada Inc.	12 fioles de 1 g Total 12 g P.A.S.	Nil Voir Suroît	Cabinet (12 fioles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (12 fioles)	Nil	Nil Demande P.A.S. avant péréemption ou si utilisation	Surdosage/intoxication aux organophosphorés	Inférieur à 1 heure

Références : 1) Dart RC, goldfrank LR, Erstad BL, Huang DT, Todd KH, Weitz J, Bebart VS, Caravati EM, Henretig FM, Delbridge TR, Banner W, Schneider SM, Anderson VE. Expert consensus Guidelines for Stocking of Antidotes in Hospitals That Provide Emergency Care. Ann Emerg Med. 2018 Mar;71(3) :314-325.e1. 2) Recommandations de stockage des antidotes en établissements de santé [En ligne]. Québec : centre antipoison du Québec ; 2017 [cité le 02-2021]. Disponible : https://www.inspq.gc.ca/sites/default/files/toxicologie-clinique/Antidotes/resume_antidotes.pdf 3) Guide Canadien des antidotes en toxicologie d'urgence [En ligne]. Association canadienne des centres antipoison ; 2018 [cité le 2 janvier 2019]. Disponible :

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Liste des antidotes disponibles au CISSS Montérégie Ouest

Antidotes en ordre alphabétique	Quantité minimale suggérée par l'hôpital	Quantité Urgence HAL	Quantité Urgence HBM	Quantité Urgence Suroît	Pharmacie HAL	Pharmacie Suroît	Indication	Délai acceptable
Protamine 10 mg/mL Fiole 5 mL Total 250 mg	5 fioles de 50 mg Total 250 mg	Cabinet (4 fioles) Salle à choc Chariot (4 fioles) Disponible dans plusieurs cabinets	Cabinet (10 fioles) CCU Cabinet (8 fioles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (10 fioles) Soins intensifs Cabinet (10 fioles)	Réserve	Carrousel	Surdosage d'héparine non fractionnée ou d'héparine de bas poids moléculaire avec saignement	Immédiat
Pyridoxine (Vitamine B6) 100 mg/mL Fiole 30 mL Total 20 g	7 fioles de 3 g Total 20 g	Armoire intox. (7 fioles)	Cabinet (7 fioles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (7 fioles)	Réserve	Carrousel	Prévention et traitement des convulsions associées à l'intoxication à l'isoniazide, aux champignons de la famille des gyromitres, et à l'hydrazine ou traitement adjuvant de l'intoxication à l'éthylène glycol	Immédiat
Sugammadex (Bridion) 100 mg/mL Fiole 5 mL Non déterminé	 Non déterminé	Salle à choc Chariot (2 fioles) Salle de réveil Cabinet (5 fioles)	Nil	Observation Cabinet (3 fioles) Salle de réveil (3 fioles)	Réserve	Carrousel	Décurarisation d'urgence après un bloc neuromusculaire induit par une dose unique de rocuronium *** Chaque cas doit être déclaré en complétant le formulaire inclus ***	
Thiamine (Vitamine B1) 100 mg/mL Ampoule 1 mL Total 1000 mg	10 ampoules Total 1000 mg	Cabinet (90 ampoules) Salle à choc Chariot (10 ampoules) Disponible dans plusieurs cabinets	Cabinet (30 ampoules) Disponible dans plusieurs cabinets	Observation cabinet (40 ampoules) Disponible dans plusieurs cabinets	Réserve	Carrousel Réserve	Adjuvant dans le traitement de l'intoxication à l'éthylène glycol	Inférieur à 1 heure
Thiosulfate de sodium (Seacalphyx) 250 mg/mL Fiole 50 mL Total 25 g	2 fioles de 12,5 g Total 25 g	Armoire intox. (2 fioles)	Cabinet (2 fioles)	Salle de Trauma Cabaret antidotes (2 fioles)	Réserve	Carrousel	Traitement adjuvant lors d'une réponse partielle à l'hydroxocobalamine	Immédiat

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Liste des antidotes disponibles au CISSS Montérégie Ouest

Antidotes en ordre alphabétique	Quantité <u>minimale</u> suggérée par l'hôpital	Quantité Urgence HAL	Quantité Urgence HBM	Quantité Urgence Suroît	Pharmacie HAL	Pharmacie Suroît	Indication	Délai acceptable
Vitamine K1 (Phytonadione) 10 mg/mL Ampoule 1 mL	10 ampoules de 10 mg Total 100 mg	Cabinet (20 ampoules) Disponible dans plusieurs cabinets	Cabinet (20 ampoules) Disponible dans plusieurs cabinets	Observation Cabinet (10 ampoules) Disponible dans plusieurs cabinets	Réserve	Carrousel Réserve	Risque de saignement suivant l'utilisation d'un antagoniste de la vitamine K	Inférieur à 6 heures

Centre antipoison du Québec : 1-800-463-5060

P.A.S. : Programme d'accès spécial de Santé Canada (produit non commercialisé au Canada)

Références : 1) Dart RC, goldfrank LR, Erstad BL, Huang DT, Todd KH, Weitz J, Bebart VS, Caravati EM, Henretig FM, Delbridge TR, Banner W, Schneider SM, Anderson VE. Expert consensus Guidelines for Stocking of Antidotes in Hospitals That Provide Emergency Care. Ann Emerg Med. 2018 Mar;71(3) :314-325.e1. 2) Recommandations de stockage des antidotes en établissements de santé [En ligne]. Québec : centre antipoison du Québec ; 2017 [cité le 02-2021]. Disponible : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/toxicologie-clinique/Antidotes/resume_antidotes.pdf 3) Guide Canadien des antidotes en toxicologie d'urgence [En ligne]. Association canadienne des centres antipoison ; 2018 [cité le 2 janvier 2019]. Disponible : Antidotes CIUSSSCN (gouv.qc.ca)		
Direction émettrice :	Direction des services professionnels et de l'enseignement médical	Entrée en vigueur :
AMC-DSPeM-6029 (Rév. 2025-04)		Révision :
		2022-07-08
		2025-03-28

Quantité non définie ou aucun consensus d’experts

Antidotes	Accessibilité	Localisation au CISSSMO	Indication	Recommandation
Anticorps spécifiques de venin de crotale (Crofab) 1 g/fiole (2 fioles par boîte)	P.A.S. Le produit est fabriqué par Protherics Inc. (Savage Laboratories / Nycomed US Inc.)	N/A	Intoxication au venin de serpent <i>viperidae</i> , <i>elapidae</i> et <i>hydrophiidae</i>	Contacter le Centre antipoison du Québec
Antitoxine botulinique	Disponible par Héma-Québec Banque de sang 514-832-5000	N/A	Botulisme	
Bleu de Prusse (Radiogardase)	P.A.S. Le produit est fabriqué par Heyltex M. Robert Martin 281 395 6640	N/A	Intoxications au thallium et au caesium	Contacter le Centre antipoison du Québec
DMSA – succimer (Chemet) Capsule 200 mg	P.A.S. Le produit est fabriqué par Ovation (É.U.) 1-800-774-4410 (Disponible au CUSM)	N/A	Intoxication au métaux lourds (mercure, arsenic ou plomb)	Contacter le Centre antipoison du Québec
DMPS (Unithiol)	Non disponible via P.A.S. Existe d’autres alternatives	N/A	Intoxication au métaux lourds (mercure, arsenic ou plomb)	Contacter le Centre antipoison du Québec
Glucarpidase	P.A.S. Contacteur fournisseur CPDN uniquement à Vaughan, Ontario 1-877-859-6336 (Disponible au CUSM)	N/A	Intoxication au méthotrexate	Contacter le pharmacien de garde
Triacétate d’uridine	P.A.S. Produit par Wellstat Therapeutics 1-800-914-0071	N/A	Intoxication au 5-FU	Contacter le pharmacien de garde

Dans la satellite d’oncologie :

Dexrazoxane injectable (pour anthracyclines si en-dedans de 6 heures) (non disponible au CISSSMO, disponible à l’Hôpital Charles Lemoine)
DMSO 99% liquide topique (bouteilles de 100 mL uniservice) (pour mitomycine et anthracyclines si supérieur à 6 heures) (Non disponible au CISSSMO)
Hyaluronidase (ampoule de 1 mL) (pour alcaloïdes de la vinca) → Servir une ampoule par cas