

SONDAGE-AÎNÉES

APPLICATION DES MEILLEURES PRATIQUES APPROCHE ADAPTÉE À LA PERSONNE ÂGÉE

* Obligatoire

IDENTIFICATION

1. Quel est votre titre d'emploi ? *

☐ PAB ☐ Infirmière auxiliaire ☐ Infirmière / infirmière chef-d'équipe ☐ Autres

2. Vous travaillez la majorité du temps sur le quart de travail : *

☐ JOUR ☐ SOIR ☐ NUIT

A - AUTONOMIE ET MOBILITÉ

3. Intervention #1 : Surveiller/évaluer le risque de chutes : médication, faiblesse, besoin pressant d'uriner, environnement dégagé, aide technique à portée, etc. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

4. Intervention #2 : Assurer la sécurité à la marche : souliers, aide technique, lunettes, appareil auditif, respect du degré d'autonomie, etc. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

5. Intervention #3 : Se référer et respecter le plan de travail : plan d'assistance, SMAF - TAI, PTI, Portrait AINÉES, PII. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

6. Intervention #4 : Impliquer et faire de l'enseignement aux usagers, aux proches, aux visiteurs, aux bénévoles, etc. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

7. Intervention #5 : Surveiller et évaluer les signes de la douleur. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

8. Intervention #6 : Assurer la mobilisation aux 2 h : au lit, au fauteuil. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

9. Intervention #7 : Assurer une séance au fauteuil minimum 2-3 fois par jour. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

10. Intervention #8 : Assurer la participation aux programmes d'exercices quotidiennement : individuels, classes d'exercices, programmes de marche, Physi-fun, pédalier, etc. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

11. Intervention #9 : Faire participer activement lors des AVQ-AVD et lors des déplacements en respectant son rythme : ne pas faire à la place. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

12. Intervention #10 : Favoriser l'utilisation de mesures de remplacement : prévenir les mesures de contrôle et l'apparition des SCPD. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

13. Quels sont les éléments/interventions qui vous aideraient à favoriser la réalisation de ces éléments de prévention du déconditionnement auprès des usagers?

- ☐ Offre de formation ou de capsule clinique
- ☐ Améliorer la disponibilité de certains équipements/matériels
- ☐ Changement ou optimisation de l'organisation du travail
- ☐ Disponibilité de certains documents ou outil clinique
- ☐ Amélioration de la communication intra et interdisciplinaire

14. Avez-vous des suggestions, des recommandations ou commentaires afin de prévenir le déconditionnement au niveau de la perte d'autonomie et de la mobilité auprès des usagers dans votre milieu de travail?

I - INTÉGRITÉ DE LA PEAU

15. Surveiller/évaluer l'intégrité de la peau (rougeurs, plaies, sécheresse) et les facteurs de risque de plaies (Braden). *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

- ☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

16. Intervention #2 : Assurer l'intégrité de la peau : assécher, hydrater, protéger, mobiliser, bien positionner, surfaces thérapeutiques. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

- ☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

17. Intervention #3 : Surveiller l'état buccodentaire et réaliser l'hygiène buccale et dentaire*

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

- ☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

18. Quels sont les éléments/interventions qui vous aideraient à favoriser la réalisation de ces éléments de prévention du déconditionnement auprès des usagers?

- ☐ Offre de formation ou de capsule clinique
- ☐ Améliorer la disponibilité de certains équipements/matériels
- ☐ Changement ou optimisation de l'organisation du travail
- ☐ Disponibilité de certains documents ou outil clinique
- ☐ Amélioration de la communication intra et interdisciplinaire

19. Avez-vous des suggestions, des recommandations ou commentaires afin de prévenir le déconditionnement au niveau de la perte d'intégrité de la peau auprès des usagers dans votre milieu de travail?

N - NUTRITION ET HYDRATATION

20. Intervention #1 : Surveiller/évaluer les changements dans les habitudes hydriques et alimentaires : apports, dysphagie. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

- ☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

21. Intervention #2 : Ajuster les repas selon les goûts (horaire, 2e choix, collations, prise d'aliments nutritifs ou maison) et les recommandations (consistances, textures, suppléments, diètes, hydratation, diète COVID, etc.) *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

- ☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

22. Intervention #3 : Assurer une hydratation régulière : stimuler, rendre disponible et offrir de l'eau ou des breuvages avant et entre les repas, aux collations et à chaque présence.*

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

- ☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

23. Intervention #4 : Stimuler l'hydratation et l'alimentation et offrir l'assistance requise. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

24. Intervention #5 : Assurer les principes d'alimentation sécuritaire : hygiène des mains, prothèses dentaires, position 90°, alimenter du bas vers le haut, rythme, ambiance calme, etc. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

25. Intervention #6 : Encourager l'alimentation au fauteuil et à la salle à manger. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

26. Quels sont les éléments/interventions qui vous aideraient à favoriser la réalisation de ces éléments de prévention du déconditionnement auprès des usagers?

- ☐ Offre de formation ou de capsule clinique
- ☐ Améliorer la disponibilité de certains équipements/matériels
- ☐ Changement ou optimisation de l'organisation du travail
- ☐ Disponibilité de certains documents ou outil clinique
- ☐ Amélioration de la communication intra et interdisciplinaire

27. Avez-vous des suggestions, des recommandations ou commentaires afin de prévenir le déconditionnement au niveau de la nutrition et de l'hydratation auprès des usagers dans votre milieu de travail?

É - ÉLIMINATION

28. Intervention #1 : Surveiller/évaluer les changements aux habitudes d'élimination fécale/urinaire : apparence ou de fréquence, etc. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

29. Intervention #2 : Assurer une routine d'élimination et répondre rapidement aux demandes d'assistance: tournée intentionnelle. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

30. Intervention #3 : Favoriser la continence à la toilette ou à la chaise d'aisance. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

31. Intervention #4 : Favoriser des interventions non pharmacologiques : marche, exercices, fibres, hydratation.

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

32. Quels sont les éléments/interventions qui vous aideraient à favoriser la réalisation de ces éléments de prévention du déconditionnement auprès des usagers?

- ☐ Offre de formation ou de capsule clinique
- ☐ Améliorer la disponibilité de certains équipements/matériels
- ☐ Changement ou optimisation de l'organisation du travail
- ☐ Disponibilité de certains documents ou outil clinique
- ☐ Amélioration de la communication intra et interdisciplinaire

33. Avez-vous des suggestions, des recommandations ou commentaires afin de prévenir le déconditionnement au niveau de l'élimination auprès des usagers dans votre milieu de travail?

E - ÉTAT COGNITIF ET COMPORTEMENT

34. Intervention #1 : Surveiller/évaluer les changements de l'état cognitif: dépression, bouchon de cérumen, SCPD, perte d'autonomie. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

35. Intervention #2 : Repérer, rapporter et dépister le délirium : RADAR, CAM, 4AT. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

36. Intervention #3 : Mettre en application l'approche de base à la communication: capter l'attention, langage simple et lent, etc. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

37. Intervention #4 : Appliquer les stratégies d'interventions: gestion de l'environnement, diversion, gestion des refus, etc. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

38. Intervention #5 : Stimuler cognitivement (orienter dans le temps, horloge et calendrier dans la chambre, prise de décisions, questionner, raconter) lors de chaque prestation de soins en utilisant l'histoire de vie, le cartable d'activités et des objets significatifs. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

39. Intervention #6 : Identifier les situations ou éléments déclencheurs de SCPD et répondre aux besoins de base.

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

40. Intervention #7 : Favoriser la communication avec le réseau social : téléphone, appels vidéo. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

41. Intervention #8 : Permettre, au minimum, un moment de bonheur, une activité de loisir ou dirigée par jour.

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

42. Intervention #9 : Rendre disponible le matériel occupationnel avant de quitter: objets significatifs, TV, casse-tête, etc. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

43. Intervention #10 : Favoriser un milieu de vie et personnaliser une routine quotidienne. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

44. Quels sont les éléments/interventions qui vous aideraient à favoriser la réalisation de ces éléments de prévention du déconditionnement auprès des usagers?

- ☐ Offre de formation ou de capsule clinique
- ☐ Améliorer la disponibilité de certains équipements/matériels
- ☐ Changement ou optimisation de l'organisation du travail
- ☐ Disponibilité de certains documents ou outil clinique
- ☐ Amélioration de la communication intra et interdisciplinaire

45. Avez-vous des suggestions, des recommandations ou commentaires afin de prévenir le conditionnement au niveau de l'état cognitif et du comportement auprès des usagers dans votre milieu de travail?

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

S - SOMMEIL

46. Intervention #1 : Surveiller/évaluer si changement dans les habitudes de sommeil. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

47. Intervention #2 : Anticiper et répondre aux besoins de base : douleur, faim, élimination, etc. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

48. Intervention #3 : Offrir des activités durant la journée. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

49. Intervention #4 : Éviter les siestes si impact sur le sommeil et regrouper les soins hors des périodes de repos. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

50. Intervention #5 : Offrir un environnement calme : éclairage, bruits, exposition à la lumière le jour. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

51. Intervention #6 : Personnaliser une routine au coucher (musique, etc.) et éviter la médication. *

Est-ce que j'applique quotidiennement les interventions pour prévenir le déconditionnement des usagers?

☐ TOUJOURS ☐ SOUVENT ☐ RAREMENT ☐ JAMAIS

52. Quels sont les éléments/interventions qui vous aideraient à favoriser la réalisation de ces éléments de prévention du déconditionnement auprès des usagers?

- ☐ Offre de formation ou de capsule clinique
- ☐ Améliorer la disponibilité de certains équipements/matériels
- ☐ Changement ou optimisation de l'organisation du travail
- ☐ Disponibilité de certains documents ou outil clinique
- ☐ Amélioration de la communication intra et interdisciplinaire

53. Avez-vous des suggestions, des recommandations ou commentaires afin de prévenir le déconditionnement au niveau du sommeil auprès des usagers dans votre milieu de travail?
