
DESTINATAIRES : Personnel infirmier et de pharmacie, professionnels et médecins du CISSMO

EXPÉDITEUR : Département de pharmacie

DATE : 2025-06-30

OBJET : **Audits des Abréviations dangereuses ou interdites 2025 - Résultats**

Nous avons fait des audits des abréviations dangereuses ou interdites, en respectant le Cadre de référence sur les règles d'émission et gestion des ordonnances pharmaceutiques. Vous trouvez en annexe la liste des abréviations dangereuses ou interdites ainsi que les trucs pour éviter des erreurs. Nous vous présentons les résultats ainsi que les recommandations ci-dessous.

Les audits ont été tenus entre les 9 et 17 juin derniers. 23 197 ordonnances ont été évaluées avec une moyenne de 2 577/jour. Les **5 abréviations à ne pas utiliser** qui ont été notées les plus souvent sont :

1- cc : 1,07 % (248 utilisations inappropriées)

Problème : Peut être pris pour «u» (unité)

Recommandation : Utiliser : «mL» ou «millilitre»

2- Noms de médicaments abrégés : 0,84 % (195 utilisations inappropriées)

Exemple : LR (pour Lactate Ringer) ou Vorico (pour voriconazole), etc.

Problème : Cela risque d'être mal interprété

Recommandation : Inscrire le nom du médicament complet.

3- < ou > : 0,72 % (166 utilisations inappropriées)

Problème : Peut être pris pour «7» (sept) ou la lettre «L». Confusion entre les symboles.

Recommandation : Utiliser : «plus grand que»/«plus que» ou «plus petit que»/«moins que»

4- D/C : 0,24 % (55 utilisations inappropriées)

Problème : Peut être interprété comme étant «discontinuer les médicaments suivants»

Recommandation : Utiliser le mot : «Congé»

5- U ou UI : 0,22 % (52 utilisations inappropriées)

Problème : Peut être pris pour «0» (zéro), «4» (quatre), ou cc OU pour «IV» (intraveineux) ou «10» (dix)

Recommandations : Utiliser le mot : «unité»

Merci de votre collaboration,

Département de pharmacie