

BULLETIN D'INFORMATION DU COMITÉ DE PHARMACOLOGIE

Modifications au formulaire

MÉDICAMENT	INDICATION(S)
Nil	

La liste des médicaments du CISSS Montérégie Ouest publiée deux fois par années est disponible sur l'intranet.

<https://intranet.ciassmo.rtss.qc.ca/fr/publications-et-documents/liste-des-medicaments-du-ciass-montereg-ouest-juillet-2022>

Substitutions automatiques par le pharmacien

Nil

La liste des substitutions automatiques par le pharmacien est disponible sur l'intranet.

<https://intranet.ciassmo.rtss.qc.ca/fr/publications-et-documents/liste-des-substitutions-automatiques-par-pharmacien>

Ordonnances individuelles pré-imprimées (nouvelles et révisions)

OIPI-608 Sédation et analgésie procédurale par voie intranasale – PÉDIATRIE URGENCE (révision)

OIPI-921 Amoxicilline-clavulanate intraveineux (révision)

OIPI-1014 Transfusion de produits sanguins labiles – clientèle de 35 kg et moins

Les outils à jour sont disponibles sur l'intranet.

Ordonnances collectives (nouvelles et révisions)

OC-6129 Initier un traitement pour une suspicion de laryngite chez la clientèle pédiatrique urgence

Les outils à jour sont disponibles sur l'intranet.

Réaction adverses aux médicaments (avis de Santé Canada)

MÉDICAMENT	COMMENTAIRES(S)
Fluoropyrimidines systémiques : (capécitabine co. et fluorouracile inj.)	Des effets indésirables graves, potentiellement mortels (stomatite, diarrhée, neutropénie et neurotoxicité) associés à ces médicaments ont été attribués au déficit en DPD (enzyme dihydropyrimidine déshydrogénase)
Léflunomide (Arava ^{MC})	Une altération de la cicatrisation des plaies après une intervention chirurgicale peut survenir chez les usagers pendant le traitement (mise à jour de monographie)

Réaction adverses aux médicaments (avis de Santé Canada) (suite)

MÉDICAMENT	COMMENTAIRES(S)
Amphétamines (toutes)	Risque d'allongement de l'intervalle QTc, de cardiomyopathie de Takotsubo et de syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) (mise à jour des monographies en cours)
Sorafénib (Nexavar ^{MC})	Risque de syndrome de lyse tumorale (SLT) (mise à jour de monographie)
Anticoagulants oraux : (apixaban, dabigatran, édoxaban, rivaroxaban, warfarine)	Risque de néphropathie liée aux anticoagulants (mise à jour de monographie)
Canakinumab (Ilaris ^{MC})	Risque de réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS) (mise à jour de monographie)
Glatiramère (Copaxone ^{MC})	Risque de réactions anaphylactiques potentiellement mortelles pouvant survenir à tout moment pendant le traitement, soit dès la première dose ou encore plusieurs mois, voire des années après le début du traitement (mise à jour de monographie)
Burosumab (Crysvita ^{MC})	Risque d'hypercalcémie sévère chez les usagers présentant certains facteurs de risque (hyperparathyroïdie tertiaire, immobilisation prolongée, déshydratation, hypervitaminose D ou insuffisance rénale) (mise à jour de monographie)
Opiïdes sur ordonnance (tous)	Risque de dysfonction œsophagienne associée à l'utilisation de longue durée (chaque jour pendant quelques semaines) (mise à jour des monographies en cours)

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/mars-2025.html#a2>

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/juin-2025.html#a2.3>

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/aout-2025.html#b4>

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/septembre-2025.html#a1>