

DÉPISTAGE COVID ET VIRUS RESPIRATOIRE

	Clientèle visée par l'analyse	COVID seul	TAAN quadruplex respiratoire (COVID, influA, influB, VRS)	Multiplex (12 virus respiratoires/ne comprend pas COVID)
Informations sur l'analyse		Procédure connue	Écouvillon nasopharyngé dans un milieu UTM (milieu rose) ou eau moléculaire.	- Fait dans un laboratoire sous-traitant; - Prélèvement nasopharyngé ou LBA dans milieu UTM (milieu rose) ou eau moléculaire; - Délai d'analyse: 7 à 10 jours.
Adultes	- Hospitalisés; - Urgence; - Milieus collectifs (Exemple : CHSLD);	Procédure connue	Patients avec SAG chez qui la conduite d'hospitaliser peut être influencée par cette analyse.	À demander si quadruplex négatif : - Selon INESSS, demander si la prise en charge, le pronostic ou l'intention de traitement sont susceptibles d'être modifiés par le résultat du test; - Inscrire renseignements cliniques.
Pédiatrie Considérer tous les enfants de ≤ 14 ans. Vous référer à adultes pour ≥ 15 ans.	- Enfant à l'urgence avec détresse respiratoire; - Enfant hospitalisé	Procédure connue	Patients avec SAG chez qui la conduite d'hospitaliser peut-être influencée par cette analyse;	- Dans certains cas d'exception un TAAN multiplex comprenant 10/12 virus respiratoires peut être demandé; - Inscrire les renseignements cliniques.