

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Québec

Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce

Douleur
Anxiété

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Québec

Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce

Douleur
Anxiété

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Québec

Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce

Douleur
Anxiété

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Québec

Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce

Douleur
Anxiété

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes	• Vérifier qu'il porte ses appareils auditifs
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
3	Boire	• Lui offrir à boire avec son liquide préféré	• Lui demander s'il a de la douleur (1 ^{ère} partie)
4	Douleur	• Observation du visage	• Écoute de ses propos et écoule de ses propos
5	Anxiété	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident	

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes	• Vérifier qu'il porte ses appareils auditifs
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
3	Boire	• Lui offrir à boire avec son liquide préféré	• Lui demander s'il a de la douleur (1 ^{ère} partie)
4	Douleur	• Observation du visage	• Écoute de ses propos et écoule de ses propos
5	Anxiété	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident	

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes	• Vérifier qu'il porte ses appareils auditifs
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
3	Boire	• Lui offrir à boire avec son liquide préféré	• Lui demander s'il a de la douleur (1 ^{ère} partie)
4	Douleur	• Observation du visage	• Écoute de ses propos et écoule de ses propos
5	Anxiété	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident	

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes	• Vérifier qu'il porte ses appareils auditifs
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
3	Boire	• Lui offrir à boire avec son liquide préféré	• Lui demander s'il a de la douleur (1 ^{ère} partie)
4	Douleur	• Observation du visage	• Écoute de ses propos et écoule de ses propos
5	Anxiété	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident	

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Québec

Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce

Douleur
Anxiété

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Québec

Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce

Douleur
Anxiété

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Québec

Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce

Douleur
Anxiété

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Québec

Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce

Douleur
Anxiété

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes	• Vérifier qu'il porte ses appareils auditifs
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
3	Boire	• Lui offrir à boire avec son liquide préféré	• Lui demander s'il a de la douleur (1 ^{ère} partie)
4	Douleur	• Observation du visage	• Écoute de ses propos et écoule de ses propos
5	Anxiété	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident	

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes	• Vérifier qu'il porte ses appareils auditifs
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
3	Boire	• Lui offrir à boire avec son liquide préféré	• Lui demander s'il a de la douleur (1 ^{ère} partie)
4	Douleur	• Observation du visage	• Écoute de ses propos et écoule de ses propos
5	Anxiété	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident	

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes	• Vérifier qu'il porte ses appareils auditifs
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
3	Boire	• Lui offrir à boire avec son liquide préféré	• Lui demander s'il a de la douleur (1 ^{ère} partie)
4	Douleur	• Observation du visage	• Écoute de ses propos et écoule de ses propos
5	Anxiété	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident	

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes	• Vérifier qu'il porte ses appareils auditifs
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
3	Boire	• Lui offrir à boire avec son liquide préféré	• Lui demander s'il a de la douleur (1 ^{ère} partie)
4	Douleur	• Observation du visage	• Écoute de ses propos et écoule de ses propos
5	Anxiété	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident	