

Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce



Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce



Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce



Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce



Voici les éléments à valider lors de la tournée intentionnelle

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident
3	Boire	• Lui offrir à boire avec adéquat de la pièce
4	Douleur (1 ^{ère} partie)	• Lui demander s'il a de la douleur
5	Anxiété	• Observation du visage
6	Éliminer	• L'apporter s'asseoir sur la toilette et changer sa culotte (si requis)
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident

Voici les éléments à valider lors de la tournée intentionnelle

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident
3	Boire	• Lui offrir à boire avec adéquat de la pièce
4	Douleur (1 ^{ère} partie)	• Lui demander s'il a de la douleur
5	Anxiété	• Observation du visage
6	Éliminer	• L'apporter s'asseoir sur la toilette et changer sa culotte (si requis)
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident

Voici les éléments à valider lors de la tournée intentionnelle

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident
3	Boire	• Lui offrir à boire avec adéquat de la pièce
4	Douleur (1 ^{ère} partie)	• Lui demander s'il a de la douleur
5	Anxiété	• Observation du visage
6	Éliminer	• L'apporter s'asseoir sur la toilette et changer sa culotte (si requis)
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident

Voici les éléments à valider lors de la tournée intentionnelle

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident
3	Boire	• Lui offrir à boire avec adéquat de la pièce
4	Douleur (1 ^{ère} partie)	• Lui demander s'il a de la douleur
5	Anxiété	• Observation du visage
6	Éliminer	• L'apporter s'asseoir sur la toilette et changer sa culotte (si requis)
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident

Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce



Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce



Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce



Tournée intentionnelle

BEC

Boire
Manger
Éliminer

Auditifs et lunettes
Bruit et luminosité
Dégager la pièce



Voici les éléments à valider lors de la tournée intentionnelle

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident
3	Boire	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
4	Douleur (1 ^{ère} partie)	• Lui offrir à boire avec son liquide préféré
5	Anxiété	• Observation du visage
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident

Voici les éléments à valider lors de la tournée intentionnelle

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident
3	Boire	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
4	Douleur (1 ^{ère} partie)	• Lui demander s'il a de la douleur
5	Anxiété	• Observation du visage
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident

Voici les éléments à valider lors de la tournée intentionnelle

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident
3	Boire	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
4	Douleur (1 ^{ère} partie)	• Lui demander s'il a de la douleur
5	Anxiété	• Observation du visage
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident

Voici les éléments à valider lors de la tournée intentionnelle

1	Appareils auditifs et lunettes	• Vérifier qu'il porte ses lunettes
2	Bruits et luminosité	• Gérer l'intensité du bruit afin de permettre la communication avec le résident
3	Boire	• Assurer un éclairage adéquat de la pièce
4	Douleur (1 ^{ère} partie)	• Lui demander s'il a de la douleur
5	Anxiété	• Observation du visage
6	Éliminer	• L'apporter s'assoit sur la toilette et changer sa culotte (si requis)
7	Douleur (2 ^{ème} partie)	• Lors de la mobilisation à la toilette, observer si le résident manifeste des signes non-verbaux de la douleur
8	Manger	• Lui offrir sa collation préférée
9	Dégagement de la pièce	• Éliminer du plancher les objets pouvant faire trébucher le résident