



MOCLI60244

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
aaaa/mm/jj

NAM : _____ Exp. _____
aaaa/mm

Nom, prénom de la mère : _____

ADMINISTRATION PRODUITS SANGUINS LABILES ET STABLES – CLIENTÈLE ADULTE

Consignes : - Excluant l'administration de granulocytes et d'immunoglobulines - Utiliser un formulaire par produit

Produit : _____ Résultats labos : _____

Date : aaaa/mm/jj Administration par : ☐ Gravité ☐ Pompe ☐ Réchauffe sang ☐ Dispositif sous pression

ÉTAT CLINIQUE DE L'USAGER AVANT LE DÉBUT DE LA TRANSFUSION / SIGNATURE

Symptômes : ☐ S/O ☐ Fatigue significative ☐ Palpitations ☐ Serrement à la poitrine ☐ Essoufflement marqué

hh:mm

hh:mm

hh:mm

ADMINISTRATION DE PRODUITS SANGUINS

SIGNES VITAUX	Heure	T°C / Site	TA	FC	FR	Sat O ₂	FiO ₂	Débit	Signes/Sx ☒	INITIALES
Pré transfusion (max 30 min avant)	hh:mm									
Début transfusion	hh:mm								☐	
15 min post début	hh:mm								☐	
Fréquence* :	hh:mm								☐	
✓ À chaque	hh:mm								☐	
heure et au	hh:mm								☐	
besoin	hh:mm								☐	
durant la	hh:mm								☐	
transfusion	hh:mm								☐	
✓ Fin transfusion	hh:mm								☐	
✓ 1h post	hh:mm								☐	
✓ 4h post	hh:mm								☐	

* Si espace insuffisant, inscrire les signes vitaux subséquents sur le formulaire dédié

NOTES D'OBSERVATIONS / SIGNATURE

hh:mm	
hh:mm	
hh:mm	
hh:mm	
hh:mm	
hh:mm	
hh:mm	
hh:mm	
hh:mm	
hh:mm	
hh:mm	
hh:mm	

Notes complémentaires : ☐

☐ Document « Avis de transfusion de produits sanguins » remis à l'utilisateur ☐ S/O

Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales

ADMINISTRATION DE PRODUITS SANGUINS LABILES CHEZ L'ADULTE - EXCLUANT LES GRANULOCYTES (Culot globulaire, plaquettes, plasma**)	ADMINISTRATION DE PRODUITS SANGUINS STABLES CHEZ L'ADULTE - EXCLUANT LES IMMUNOGLOBULINES (Albumine 25%**)
Se référer à la procédure clinique en vigueur sur l'administration des produits sanguins labiles (excluant les granulocytes) (PRO-10354).	Se référer à la procédure clinique en vigueur dans votre établissement.
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
- La veine ouverte ne doit servir qu'à l'administration du produit sanguin durant la transfusion. - Prioriser l'administration des produits sanguins par un cathéter de calibre supérieur ou égal à 20G.	
DISPOSITIFS ET MÉTHODES D'ADMINISTRATION	
- Utiliser un dispositif à transfusion en Y avec filtre : - Effectuer le vide d'air avec un soluté de NaCl 0,9%. - Connecter directement au dispositif d'accès veineux. - Le filtre est efficace pour administrer deux produits sanguins de même nature dans un délai maximal de 4 heures.	- Utiliser une tubulure ventilée sans filtre : - Effectuer le vide d'air avec l'Albumine. - Connecter directement au dispositif d'accès veineux. - La tubulure peut être conservée pour administrer plusieurs produits dans un délai maximal de 4 heures (sauf si présence d'air dans le dispositif).
DÉBITS D'ADMINISTRATION	
- Débuter à 30 mL/h pour les 15 premières minutes. - Augmenter à 125 mL/h ou 200 mL/h jusqu'à la fin de la transfusion selon l'état clinique de l'usager en respectant la prescription médicale ou la procédure clinique.	- Débuter à 30 mL/h pour les 15 premières minutes. - Augmenter à 120 mL/h selon la procédure clinique jusqu'à la fin de la transfusion. - Si administration de plusieurs bouteilles avec le même numéro de lot : - Débuter les bouteilles subséquentes en conservant le même débit (120 mL/h). - Si numéro de lot est différent : Recommencer du début, soit à 30 mL/h x 15 min.
Administrer le produit dans un délai maximum de 4 heures suivant l'heure d'émission inscrite sur le bordereau remis par la Banque de sang (incluant le rinçage de la tubulure).	
SURVEILLANCES CLINIQUES	
- Observer l'usager, le débit d'administration et l'état du site IV aux 30 minutes durant la transfusion et au besoin. Signes vitaux : Avant la transfusion : Maximum 30 minutes avant le début et avant la cueillette du produit à la banque de sang. 15 minutes après le début, aux heures, à la fin, 1 heure post transfusion, 4 heures post transfusion et au besoin. - Clientèle externe : L'usager peut quitter dès la fin de l'administration du produit si aucun changement clinique noté.	
Si présence de signes et symptômes (Sx) de réaction transfusionnelle : - Arrêter la perfusion. - Initier l'ordonnance collective (OC-6098) de réaction transfusionnelle et faire les prélèvements et examens requis. - Aviser le médecin et la Banque de sang. - Suivre la procédure clinique <i>PRO-10284 Réaction transfusionnelle et administration d'un produit qui n'aurait pas dû l'être (APNDE)</i> et compléter le <i>AH-520 Déclaration d'événement indésirable associé à la transfusion</i>.	
À LA FIN DE LA TRANSFUSION	
Rincer la tubulure de transfusion avec 50 mL de NaCl 0,9% en conservant le débit d'administration (125 ou 200 mL/h).	Changer la bouteille d'Albumine pour un sac de NaCl 0,9% et rincer la tubulure avec 30 mL en conservant le même débit d'administration (120 mL/h).
Rappel : L'heure de fin de transfusion est l'heure à laquelle le rinçage s'est terminé.	

**** Il existe d'autres types de produits sanguins labiles et stables que ceux mentionnés ci-dessus. Pour connaître leur procédure d'administration, veuillez consulter les documents associés en vigueur dans votre établissement.**