



MOCLI60315

Installation : _____

Dossier : _____
 Nom, Prénom : _____
 Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
 aaaa-mm-jj
 NAM : _____ Exp. _____
 aaaa-mm
 Nom, Prénom de la mère : _____

ADMISSION – CENTRE HOSPITALIER BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES (BMR)

Consigne : À compléter dès qu'une hospitalisation est demandée

Questions à poser	Actions à effectuer (si réponse = OUI)
1. Est-ce qu'un avis «Contact» ou «Préventif» est au dossier de l'utilisateur? ☐ Oui ☐ Non L'utilisateur est-il connu porteur de bactéries multirésistantes? ☐ Oui ☐ Non Préciser la bactérie : ☐ SARM ☐ ERV ☐ EPC ☐ Autre : _____	- Dépistage SARM, ERV, EPC selon l'avis au dossier (EPC ou contact EPC, dépister aux jours 0, 7 et 14) - Précautions additionnelles Contact A ou B ou selon l'avis au dossier
2. Est-ce l'utilisateur habite dans un centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) ou une MDA-MA? ☐ Oui ☐ Non Préciser : _____ aaaa/mm/jj	- Dépistage SARM, ERV - Précautions additionnelles Contact B
Admission de l'urgence : 3. Dans les 12 derniers mois, avez-vous séjourné plus de 24 heures dans un hôpital ou centre de réadaptation au Québec (UTRF, URFI)? ☐ Oui ☐ Non ☐ Incertain (aller à la question 6.) Préciser : _____ aaaa/mm/jj	- Dépistage SARM, ERV - Précautions additionnelles Contact B (Appliquer les précautions seulement si l'installation nommée est une autre que celle où l'utilisateur est présentement)
Unité de soins (usager hospitalisé sans passer par l'urgence) : 3. L'utilisateur a-t-il été transféré directement d'un autre hôpital ou centre de réadaptation (UTRF, URFI)? ☐ Oui ☐ Non Préciser : _____	
→ Si oui à la question 3. = Se référer à l'« Avis BMR » L'installation se retrouve-t-elle sur la liste des milieux de soins? ☐ Oui ☐ Non	- Ajouter le dépistage EPC ou <i>Acinetobacter</i> selon le milieu (Faire jours 0, 7 et 14) - Précautions additionnelles Contact B (Appliquer les précautions seulement si l'installation nommée est une autre que celle où l'utilisateur est présentement)
L'installation est-elle visée par la surveillance <i>Candida auris</i> ? ☐ Oui ☐ Non	- Ajouter le dépistage <i>Candida auris</i> (Faire jours 0, 7 et 14) - Précautions additionnelles Contact+ C
4. Avez-vous séjourné plus de 24 heures dans un hôpital ou un centre de réadaptation hors Québec au cours des 12 derniers mois? ☐ Oui ☐ Non Préciser : _____ aaaa/mm/jj	- Dépistage SARM, ERV, EPC, <i>Acinetobacter</i> et <i>Candida auris</i> (Faire tous les dépistages jours 0, 7 et 14) - Précautions additionnelles Contact+ C
5. Est-ce que l'utilisateur ou sa famille sont dans l'incapacité de répondre? ☐ Oui ☐ Non Préciser : _____ → Réponses obtenues de : ☐ Usager ☐ Famille / Proche Si famille/proche, préciser le lien : _____	- Dépistage SARM, ERV, EPC et <i>Acinetobacter</i> (Faire EPC et <i>Acinetobacter</i> jours 0, 7 et 14) - Précautions additionnelles Contact B
_____ Signature de l'employé qui remplit le questionnaire	Date : _____ aaaa/mm/jj _____ hh:mm
_____ Signature et titre de la personne qui valide les réponses, fait les prélèvements et donne l'enseignement sur Précautions additionnelles / Hygiène des mains à l'utilisateur ou ses proches	Date : _____ aaaa/mm/jj _____ hh:mm

☐ Questionnaire analysé par le service PCI : _____ Date : _____ aaaa-mm-jj
 Signature et titre

SITES DE DÉPISTAGE SELON LES INDICATIONS DU QUESTIONNAIRE**Pour la recherche SARM**

- Culture du nez: Un seul écouvillon pour les 2 narines
- Culture de plaie, si écoulement
- Culture de l'ombilic: Chez le nouveau-né dont le cordon est toujours en place

Pour la recherche ERV

- Écouvillonnage rectal: l'écouvillon doit être inséré à une profondeur de quelques millimètres dans le rectum afin d'être souillé par des selles
- Écouvillonnage de stomie intestinale avec écouvillon teinté de selles

Pour la recherche EPC

- Écouvillonnage rectal: l'écouvillon doit être inséré à une profondeur de quelques millimètres dans le rectum afin d'être souillé par des selles
- Écouvillonnage de stomie intestinale avec écouvillon teinté de selles

Pour la recherche *Acinetobacter* (tous les sites possibles sont exigés)

- Écouvillonnage rectal: l'écouvillon doit être inséré à une profondeur de quelques millimètres dans le rectum afin d'être souillé par des selles
- Écouvillonnage de stomie intestinale avec écouvillon teinté de selles
- Aines / Aisselles (un seul écouvillon pour ses sites)
- Gorge ou sécrétions endotrachéales, si intubé
- Plaies
- Stomies, site de drains et cathéters
- Urine (si présence de sonde)
- Sites auparavant positifs chez les porteurs connus

Pour la recherche de *Candida auris*

- Aines, aisselles, culture du nez (un seul écouvillon pour ces sites)