

Installation : _____

Dossier : _____
 Nom, Prénom : _____
 Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
 aaaa-mm-jj
 NAM : _____ Exp. _____
 aaaa-mm
 Nom de la mère : _____

CRITÈRES DE SÉVÉRITÉ – COVID-19 SOINS À DOMICILE (SAD)

Consignes : Attribuer 1 point par symptôme léger, 2 points par symptôme modéré et 4 points par symptôme sévère

Symptômes	Léger (1 point)	Modéré (2 points)	Sévère (4 points)	Points
Atteinte des AVQ/AVD	Habituelle	Limitation de novo (seulement AVD)	Limitation de novo AVQ et AVD	
Atteinte cognitive	Légère, sans impact AVQ/AVD	Désorientation de novo	Stupeur/Coma	
Température	Entre 35°C et 38°C	34-34,9°C <u>ou</u> 38,1°C-39°C	Moins de 34°C <u>ou</u> plus de 39°C	
Céphalée inhabituelle	Intensité 5 à 8/10 (soulagée par médication)	Intensité 5 à 8/10 (non soulagée par médication)	Supérieure à 8/10 <u>ou</u> présence de symptômes neurologique, vomissement en jet	
Toux inhabituelle	Sèche	Productive, colorée, émetisante	Productive, abondante et colorée, fièvre, hémoptysie	
Rhinorrhée	Claire	Colorée et/ou facialgie		
Odynophagie	Sans dyspnée, dysphonie, dysphagie	Avec dyspnée, dysphonie, dysphagie		
Dyspnée	Marche plus lentement qu'à l'habitude <u>ou</u> doit faire des pauses	Doit s'arrêter pour reprendre son souffle lors AVQ/AVD	Très essoufflé à la parole <u>ou</u> au repos	
Dénutrition, déshydratation	Inappétence relative		Anorexie	
Obstruction respiratoire	Épisode transitoire bref de bruits anormaux	Bruits respiratoires récurrents, audibles	Bruits respiratoires constants	
Douleur rétrosternale	DRS atypique	Angine lors d'un effort inhabituel	Angine lors d'un effort usuel <u>ou</u> au repos	
Dyspnée au repos		Intermittente	Continue	
Exercice de vocalisation			Moins de 5 secondes	
Vomissements	Moins de 5	Entre 5 et 10	Plus de 11 <u>ou</u> hématomèse <u>ou</u> fécaloïde	
Douleur abdominale	Intensité 5 à 6/10 (caractère diffus)	Intensité 7 à 8/10 (symptôme localisateur)	Intensité 9 à 10/10 <u>ou</u> péritonisme (incapable de sauter <u>ou</u> de faire grand ventre/petit ventre)	
Diarrhée	Moins de 5	5 à 10	Plus de 11 <u>ou</u> saignement GI	
Suicidalité	Flash suicidaires <u>ou</u> idée de mort passive	Idéation	Idéation persistante <u>ou</u> plan	

Source : Ministère de la solidarité et de la santé. (2020). Lignes directrices : prise en charge des patients Covid-19. Rép. Française

Interprétation du score : Inférieur à 20 = sévérité degré I ou II (si comorbidité)
Entre 20 et 30 = sévérité degré III
Supérieur à 30 = sévérité degré IV

POINTAGE

60

☐ Consentement de l'utilisateur obtenu pour acheminer la présente évaluation à : _____

Signature de l'intervenant et titre : _____ No. Permis : _____ Date : _____ aaaa/mm/jj