

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
aaaa-mm-jj

NAM : _____ Exp. _____
aaaa-mm

Nom de la mère : _____

ÉVALUATION DES CAPACITÉS FONCTIONNELLES DIALYSE PÉRITONÉALE

Consignes :

1. Regrouper tout le matériel nécessaire à l'évaluation sur un bureau ou une table
2. Expliquer verbalement à l'usager les tâches 1 à 8 et effectuer une démonstration de façon concomitante
3. Évaluer la capacité de l'usager à effectuer les tâches 1 à 8
4. Demander à l'usager d'effectuer les tâches 9 et 10 sans assistance
5. Documenter les observations effectuées durant l'évaluation

Matériel requis :

- 1 ligne de transfert Baxter avec capuchon MiniCap
- 1 capuchon MiniCap dans son emballage
- 1 clampe rouge
- 1 sac de dialysat de 2 Litres (poches jumelées) avec tubulure et anneau de traction coloré
- 1 abaisse-langue
- 1 tige à soluté
- 1 crayon à mine
- 1 efface
- Formulaire CLI-60129

Tâches	Complétée avec succès	Non complétée OU Incapacité	Commentaires
1. Prenez le sac de dialysat de 2 litres et soulevez-le au-dessus de votre tête pendant 3 secondes.			
2. Accrochez le sac de dialysat sur la tige à soluté.			
3. Prenez la ligne de transfert. Ouvrez la clampe et fermez la complètement.			
4. Ouvrez l'emballage du capuchon MiniCap, enlevez le capuchon sur la ligne de transfert et remettez le nouveau capuchon sur la ligne de transfert.			
5. Retirez l'anneau de traction coloré sur le sac de dialysat.			
6. Attachez la clampe rouge à n'importe quel endroit sur la tubulure du sac de dialysat et fermez la clampe.			
7. Ouvrez la clampe rouge et libérez-la de la tubulure.			
8. Prenez l'abaisse-langue et cassez-le en deux morceaux.			
9. Test de mémoire			Résultat :
10. Test de l'horloge de Watson (CLI-60129)			Résultat :

Nom :

Prénom :

#Dossier :

OBSERVATION ET ÉVALUATION

[illegible]

AIDE TECHNIQUE À ENVISAGER

INTERPRÉTATION ET CONDUITE

- ✓ Si le résultat du test de l'horloge est égal ou inférieur à 10
OU
- ✓ Si l'utilisateur est incapable de compléter avec succès au moins 3 tâches des 8 premières tâches de l'évaluation
OU
- ✓ Si le jugement clinique de l'infirmière met en doute la capacité fonctionnelle de l'utilisateur OU de son aidant à effectuer la dialyse péritonéale de façon autonome

DISCUTER AVEC LE NÉPHROLOGUE OU AVEC L'ÉQUIPE DÉDIÉE À LA RÉUNION INTERDISCIPLINAIRE AVANT DE POURSUIVRE LES DÉMARCHES EN VUE DE L'INSTALLATION DU CATHÉTER DE DIALYSE PÉRITONÉALE

Références: BCRenal (2017). Peritoneal Dialysis Functional Assessment.

Signature de l'infirmière :

Date : aaaa/mm/jj