



MOCLI60780

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
aaaa/mm/jj

NAM : _____ Exp. _____
aaaa/mm

Nom, prénom de la mère : _____

PROTOCOLE OPÉRATOIRE ET FEUILLE SOMMAIRE OPHTHALMOLOGIE

☐ Œil droit

☐ Œil gauche

Diagnostic pré-opératoire:

☐ Cataracte ☐ Aphakie ☐ Pseudophakie ☐ Astigmatisme ☐ Glaucome

Diagnostic post-opératoire:

☐ Idem ☐ Autre: _____

Opération projetée :

☐ Phacoémulsification ☐ Extraction extracapsulaire ☐ Trabéculéctomie ☐ XEN 63
☐ Lentille intraoculaire sac ☐ Sulcus ☐ Chambre antérieure ☐ Échange de lentille intraoculaire
☐ Vitrectomie antérieure → ☐ Au vitrecteur ☐ À l'éponge

Opération pratiquée :

☐ Idem ☐ Autre : ☐ Phacoémulsification ☐ Extraction extracapsulaire ☐ Extraction intracapsulaire
☐ LIO sac ☐ Sulcus ☐ Chambre antérieure ☐ Échange de lentille intraoculaire
☐ Vitrectomie antérieure → ☐ Au vitrecteur ☐ À l'éponge

Anesthésie :

☐ Topique Xylogel 2% sans conservateurs + Tétracaine 0,5%
☐ Para bulbaire ☐ Rétro bulbaire ☐ Sous conjonctivale
☐ Sédation IV ☐ Anesthésie générale

() mL de Xylocaïne 2% ☐ Avec Épinephrine

☐ Mitomycine C (0,4 mg/ml) 0,1 mL

Aseptie :

☐ Peau et conjonctive avec Provioline 1% ☐ Peau avec Chlorhexidine 1:2000 si allergie à l'Iode topique

Drainage et exposition avec écarteur à paupières

Ouverture conjonctivale : ☐ Limbique ☐ Para-limbique

Incision perforante :

☐ Cornéenne ☐ Limbique ☐ Sclérale (tunnel)
☐ Cautère ☐ Trabéculéctomie au punch

Incision relaxante limbique 550um de profondeur

arc _____ site _____ + arc _____ site _____

Rx intraoculaire :

☐ BSS avec Épi (1 mg/l) ☐ BSS+ avec Épi ☐ Phényléphrine 10% ☐ Xylocaïne 1% sans conservateurs
☐ Duovisc ☐ Viscoat ☐ Provisc ☐ Healon ☐ Air ☐ Vert indocyanine ☐ Bleu trypan
☐ Manipulations iriennes : ☐ Malyugin ☐ Étirement ☐ Crochets ☐ Sphinctérotomies ☐ Iridectomie

Capsule antérieure:

☐ Capsulorhexis continue ☐ Capsulorhexis « can opener » ☐ Crochet ☐ Déchirure :

Extraction du cristallin :

☐ Phacoémulsification
☐ Aspiration ☐ Pression cornéo-sclérale
☐ Phacosection ☐ Vitrecteur

Capsule postérieure :

☐ Intacte ☐ Polie ☐ Opaque ☐ Rupture : ☐ via plaie
☐ Intact ☐ Perte ☐ Vitrectomie ☐ Au vitrecteur ☐ Via p. plana
☐ À l'éponge

Lentille intraoculaire:

☐ Sac ☐ Sulcus ☐ CA ☐ Anneau capsulaire
Marquage et positionnement de lentille torique à _____ deg.

Irrigation/aspiration

Antibiotiques IC (Vigamox 0,5 mg)

Miotique : ☐ Miochol ☐ Miostat
Sutures : ☐ Nylon 10-0 ☐ Prolène 10-0 ☐ Vicryl 10-0 ☐ Autres : _____

Fermeture de la conjonctive:

☐ Cautérisation ☐ Positionnement simple ☐ Surjet vicryl 9,0
☐ Écarteur à paupières enlevé et drainage enlevé. ☐ Suture autre : _____

Geste Final :

☐ Provioline 0,5% ☐ Pilocarpine 4% ☐ Pilopine ☐ Tobradex ong ☐ Iopidine 0,5% ☐ Autres _____
☐ Vigamox 0,5% ☐ Protecteur ☐ Pansement non compressif

Autres(s) diagnostic(s) : _____

Complication(s) : _____

Orientation de l'utilisateur au congé : ☐ Domicile ☐ Autre (précisez) : _____

Copie à _____ ☐ Copie remise à l'utilisateur

Nom du médecin ou établissement (l'autorisation de l'utilisateur est obligatoire)

Signature du médecin : _____ Date : _____ aaaa/mm/jj