



MOCLI60790

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
aaaa/mm/jj

NAM : _____ Exp. _____
aaaa/mm

Nom, prénom de la mère : _____

PLAN D'ENSEIGNEMENT PHOTOTHÉRAPIE EN CENTRE HOSPITALIER

Date : ____/____/____ Heure : ____:____

L'enseignement a été fait auprès de : ☐ Mère ☐ Deuxième parent

☐ Autre, préciser (nom et lien) : _____

ENSEIGNEMENT	FAIT (Inscrire date)	INITIALES
Traitement de la photothérapie		
La nécessité et les raisons du traitement par photothérapie à l'hôpital.	aaaa/mm/jj	
Les risques associés au non-respect du plan de traitement .	aaaa/mm/jj	
L'importance que la peau du nouveau-né soit exposée à la lumière le plus possible afin d'assurer une efficacité optimale du traitement, c'est pourquoi nous gardons seulement la couche et la protection oculaire .	aaaa/mm/jj	
Les parents comprennent l'importance de ne pas interrompre le traitement de photothérapie afin de permettre une amélioration de l'état de santé du nouveau-né. * Si possible, poursuivre le traitement de photothérapie avec la « Bilisoft » durant les périodes d'allaitement (Maintenir en place les lunettes de protection). * Limiter à une période maximale de 30 min les soins offerts au nouveau-né sans photothérapie.	aaaa/mm/jj	
Fonctionnement de l'incubateur (selon le modèle et à l'aide de l'aide-mémoire clinique associé)	aaaa/mm/jj	
Rappel sur les mesures préventives pour le risque de chute chez le nouveau-né conformément au CLI-60250 Dépistage et évaluation - risque de chute périnatalité	aaaa/mm/jj	
Soins et surveillance de leur nouveau-né		
L'importance de respecter les recommandations du pédiatre reliées à l'allaitement ou autre méthode d'alimentation pour prévenir la déshydratation.	aaaa/mm/jj	
Encourager l'allaitement et l'expression manuelle chez la mère.	aaaa/mm/jj	
Au besoin, utiliser le tire-lait à chaque 3h pour maintenir une production.	aaaa/mm/jj	
Les signes et symptômes de l'ictère (se référer à l'ordonnance collective en vigueur)	aaaa/mm/jj	
Les lunettes de protection doivent être laissées en place en tout temps lorsqu'une lumière de photothérapie est allumée, incluant la « Bilisoft ». * TOUJOURS éteindre les lumières de photothérapie avant de retirer les lunettes de protection.	aaaa/mm/jj	
Nettoyer les yeux une fois par jour avec de l'eau stérile (prévention des infections)	aaaa/mm/jj	
Le nouveau-né doit être placé en couche à plat dans l'incubateur afin d'assurer un traitement efficace.	aaaa/mm/jj	
Le nouveau-né doit dormir sur le dos en suivant les principes du « Sommeil sécuritaire » de l'Agence de santé publique du Canada ».	aaaa/mm/jj	
Surveiller l'intégrité de la peau : La photothérapie peut entraîner des changements de couleur et une éruption cutanée; Éviter d'appliquer de la crème et de l'huile sur la peau du bébé; Assurer une hygiène adéquate après chaque changement de couche.	aaaa/mm/jj	
L'importance de surveiller les selles et mictions durant le traitement de photothérapie (La bilirubine s'élimine par les mictions et les selles) La photothérapie peut entraîner la diarrhée	aaaa/mm/jj	
Quand aviser l'infirmière		
• Si atteinte à l'intégrité de la peau • Si présence de signes de déshydratation (verso) • Au début et à la fin d'un boire	• Si l'alarme de l'incubateur sonne • Si déplacement dans la position des lampes	aaaa/mm/jj
Autre : _____		

Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales

[illegible]

Date : ____/____/____