

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom, Prénom de la mère : _____

COLONOSCOPIE OU SIGMOIDOSCOPIE INTERNE

Poids : _____ kg Taille : _____ cm

Allergies : _____ Clairance créatinine : _____ mL/min

Date de l'examen : _____ AAAA-JJ-MM Heure prévue : _____ HH : HH

- La veille de l'examen, au matin, débiter la diète liquide (au moins 250 mL/h de liquide clair → voir Annexe);
- Le jour de l'examen :
 - Donner les médicaments usuels du matin. Par contre éviter les anticoagulants, les antiplaquettaires, les hypoglycémiant, l'insuline et le supplément de fer suivants : _____
 - Prévoir un accès veineux (cathéter court salin, si pas de soluté en place)
 - S'assurer que l'usager ne porte aucun bijou
 - Deux heures avant l'examen, garder l'usager à jeun complètement.

OPTION 1 (option à favoriser chez les usagers constipés)

Bisacodyl 15 mg

Initiales

LA VEILLE DE L'EXAMEN VERS MIDI :

- Prendre la dose de bisacodyl 15 mg (3 comprimés de 5 mg) PO

Polythylèneglycol (PEG) 3350 (Peglyte, Golytely, Colyte)

Initiales

LA VEILLE DE L'EXAMEN VERS 17H00 :

- Ajouter de l'eau froide jusqu'à la ligne de remplissage sur le contenant (donne 4 litres)
- Boire 2 litres de cette préparation : un verre (250 mL) toutes les 10 minutes
- La totalité des 2 premiers litres doit être bue
- Conserver les 2 litres restants au réfrigérateur.

LE JOUR DE L'EXAMEN, boire uniquement de l'eau et 4 HEURES AVANT L'EXAMEN :

- Boire la totalité des 2 litres restants, un verre (250 mL) toutes les 10 minutes.

OPTION 2 (option réservée aux usagers jeunes sans comorbidité)

Bisacodyl 10 mg

Initiales

LA VEILLE DE L'EXAMEN VERS MIDI :

- Prendre la dose de bisacodyl 10 mg (2 comprimés de 5 mg) PO

Picosulfate sodique + oxyde de magnésium + acide citrique (Pico-Salax)

Initiales

LA VEILLE DE L'EXAMEN VERS 16H00 :

- Dissoudre le contenu du 1^{er} sachet dans 150 mL d'eau froide et remuer 3 minutes jusqu'à dissolution
- Boire toute la préparation
- Boire ensuite 1500 à 2000 mL de liquides clairs permis en 4 heures (éviter de boire uniquement de l'eau).

LE JOUR DE L'EXAMEN, 4 HEURES AVANT L'EXAMEN :

- Dissoudre le contenu du 2^e sachet dans 150 mL d'eau froide et remuer 3 minutes jusqu'à dissolution
- Boire toute la préparation
- Boire ensuite 1500 à 2000 mL de liquides clairs permis en 1 à 2 heures (éviter de boire uniquement de l'eau)
- Par la suite, ne plus boire.

Date et heure (aaaa/mm/jj)

Signature du prescripteur

permis

☐ Envoyé par _____ (init.)

Heure d'envoi :

Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)

COLONOSCOPIE OU SIGMOIDOSCOPIE INTERNE (SUITE)

Dossier : _____
Nom, Prénom : _____
Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ
NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM
Nom, Prénom de la mère : _____

OPTION 3

Polythylèneglycol (PEG) 3350 + électrolytes + bisacodyl (Bi-Peglyte*)

Initiales _____

LA VEILLE DE L'EXAMEN VERS MIDI :

- Prendre la dose de bisacodyl 15 mg (3 comprimés de 5 mg) PO

LA VEILLE DE L'EXAMEN VERS 17H00 :

- Ajouter de l'eau froide jusqu'à la ligne de remplissage du contenant (Peglyte, Golytely, Colyte) (donne 4 litres)
- Boire 1 litre de cette préparation : un verre (250 mL) toutes les 10 minutes
- La totalité du premier litre doit être bue
- Jeter les 2 litres de surplus et conserver le litre restant au réfrigérateur
- Boire ensuite 1500 à 2000 mL de liquides clairs permis.

LE JOUR DE L'EXAMEN, boire uniquement de l'eau et 4 HEURES AVANT L'EXAMEN :

- Boire la totalité du litre restant : un verre (250 mL) toutes les 10 minutes.

*** Ce produit n'est pas disponible au formulaire d'établissement, une substitution automatique est appliquée.**

Date et heure (aaaa/mm/jj)

Signature du prescripteur

permis

☐ Envoyé par _____ (init.)

Heure d'envoi : _____

Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)

ANNEXE

Liquides clairs permis :

- Eau
- Boissons sportives de type *Gatorade* ou *Powerade*, sauf rouge ou mauve
- Jus de fruits clairs (orange sans pulpe, pomme, canneberge blanche, raisin blanc, limonade sauf rouge ou mauve)
- Bouillon ou consommé clair (bœuf ou poulet)
- *Jello*, sauf rouge ou mauve
- Boissons gazeuses blanches ou pâles (soda au gingembre/*Ginger Ale*, *7up*, *Sprite*)
- Thé glacé
- *Kool-Aid*, sauf rouge ou mauve
- Café, thé ou tisane noire (attention de ne pas mettre de lait ou de crème)

Liquides interdits :

- Produits laitiers
- Supplément nutritionnel de type *Boost*, *Ensure*, *Glucerna*
- Jus avec pulpe
- Jus de tomates ou de légumes
- Liquide rouge ou mauve
- Boissons gazeuses noires ou colorées (*Coke*, *Pepsi*, *Mountain Dew*)
- Alcool