

Mesures spécifiques en CLSC et SAD en présence de bactéries multirésistantes (BMR) et du *Clostridium difficile* (CLSC Vaudreuil-Dorion, Rigaud et Saint-Polycarpe)

Contactez l'équipe de prévention et contrôle des infections (PCI) en présence d'un résultat d'analyse positif à d'autres bactéries telles que **Bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE)**, ***Pseudomonas aeruginosa* résistant**, ***Stenotrophomonas maltophilia* résistant** et en cas de doute.

ÉLÉMENTS	ERV	SARM	EPC	<i>Acinetobacter Baumannii</i>	<i>Clostridium difficile</i>
Documentation	• Compléter le formulaire « Avis de dépistage ou de porteur d'une bactérie multirésistante ou autre infection » et insérer à la première page du dossier • Compléter dans SIMO pour le SAD • Compléter au dossier				
Site où la bactérie peut être présente	• Selles • Rectum • Plaie • Peau au pourtour d'une stomie • Urine si porteur d'une sonde	• Narine • Plaie • Peau au pourtour d'une stomie • Voies respiratoires • Urine si porteur d'une sonde	• Selles • Rectum • Plaie • Peau au pourtour d'une stomie • Urine si porteur d'une sonde • Voies respiratoires si intubation ou trachéotomisé	• Selles • Rectum • Gorge ou sécrétions endotrachéales si intubé • Plaie • Peau au pourtour d'un drain • Peau au pourtour d'une stomie • Aines ou aisselles • Urine si porteur d'une sonde	• Selles
Modes de transmission	• Mains • Matériel et équipement • Environnement	• Mains • Matériel et équipement • Environnement (faible)	• Mains • Matériel et équipement • Environnement	• Mains • Matériel et équipement • Environnement • Peut survivre des mois sur des surfaces très sèches	• Mains • Matériel et équipement • Environnement
Pratique de base et précautions additionnelles	• Pratique de base • Précautions additionnelles « contact » seulement si incontinence fécale non contenue ou plaie avec écoulement non contenu ○ Blouse ○ Gant ○ Hygiène des mains	• Pratiques de base • Précautions additionnelles « gouttelettes » seulement si diagnostic de pneumonie à SARM : ○ Masque de procédure	• Précaution additionnelle « contact » ○ Blouse ○ Gant ○ Hygiène des mains • Précautions additionnelles « Gouttelettes et contact » si diagnostic d'infection respiratoire ou intubation/trachéo ○ Ajouter le masque de procédure	• Précaution additionnelle « Contact + » ○ Blouse ○ Gant ○ Hygiène des mains obligatoires avec eau et savon	

ÉLÉMENTS	ERV	SARM	EPC	Acinéobacter Baumannii	Clostridium difficile
Matériel de soins	• Limiter le matériel (appareil à pression, stéthoscope, appareil à glycémie, etc.) ○ Matériel dédié si possible • Nettoyer et désinfecter avec une lingette germicide de routine immédiatement après avoir effectué le soin • Soins à domicile : placer le matériel dans un sac de plastique pour être nettoyé et désinfecté				• Matériel dédié • Nettoyer avec une lingette Clorox® et désinfecter avec une deuxième lingette Clorox®
Buanderie	• Le lavage peut se faire de façon habituelle avec un détergent commercial courant en utilisant de l'eau chaude ou tiède.				
Vaisselle	Aucune mesure particulière				
Toilette	• Aucune mesure particulière		• Toilette privée ou chaise d'aisance avec sac hygiénique • Soins à domicile : aucune mesure particulière		
Nettoyage et désinfection de la salle de toilette et environnement	• Nettoyer et désinfecter avec une lingette germicide de routine Soins à domicile : • Nettoyage et désinfecter la chambre et la salle de bain plus fréquemment un désinfectant à base d'eau de javel peut être utilisé (1 partie d'eau de javel diluée dans 9 parties d'eau)	• Aucune mesure particulière	• Nettoyer et désinfecter avec une lingette germicide de routine Soins à domicile : • Nettoyage et désinfecter la chambre et la salle de bain plus fréquemment un désinfectant à base d'eau de javel peut être utilisé (1 partie d'eau de javel diluée dans 9 parties d'eau)		• Nettoyer et désinfecter avec une lingette Clorox® Soins à domicile : • Nettoyage et désinfecter la chambre et la salle de bain plus fréquemment un désinfectant à base d'eau de javel peut être utilisé (1 partie d'eau de javel diluée dans 9 parties d'eau)
Suivi de l'état de porteur	• Aucun	• Aucun	• Aucun	• Aucun	• Aucun
Durée des précautions additionnelles	• Aucune	• Aucune	• Selon les recommandations de l'équipe PCI	• Selon les recommandations de l'équipe PCI	• Jusqu'à 72 heures après le retour des selles formées • Vigilance si reprise de diarrhée
Consultation et transfert inter-établissement	• Compléter et faire suivre le formulaire « Statut infectieux de l'usager »				
Usager et son entourage					
Accès à l'extérieur	• Aucune restriction	• Aucune restriction	• Aucune restriction, sauf si présence d'incontinence fécale non contenue, plaie avec écoulement non contenu ou infection respiratoire • Hygiène des mains		• Restriction si possible
Famille et visiteurs	• Remettre un feuillet d'information au client et à sa famille		• Informer le client et sa famille		• Remettre un feuillet d'information au client et à sa famille