

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :	Infirmières et gestionnaires des GMF de Santé Québec Montérégie-Ouest
EXPÉDITEUR :	Geneviève Lafleur, conseillère cadre en soins infirmiers par intérim, DSI
DATE :	Le 10 septembre 2026
OBJET :	Déploiement : OC-6128 Initier des mesures diagnostiques en présence de symptômes et signes suggestifs d'une infection urinaire (cystite et pyélonéphrite) et initier un traitement pharmacologique <i>per os</i> de première intention pour la cystite chez une personne âgée de 14 ans et plus OIPI-1022 Formulaire de liaison avec la pharmacie communautaire

Des travaux ont été réalisés afin de permettre aux infirmières œuvrant en première ligne d'initier des mesures diagnostiques et un traitement pharmacologique en présence de symptômes et de signes suggestifs d'une infection urinaire. Une ordonnance collective et un formulaire de liaison ont été élaborés à partir du protocole médical national de l'INESSS, permettant ainsi d'améliorer la prise en charge de la clientèle et optimiser la pratique infirmière.

À compter d'aujourd'hui, ces outils cliniques sont disponibles dans l'intranet.

- [OC-6128](#) Initier des mesures diagnostiques en présence de symptômes et signes suggestifs d'une infection urinaire (cystite et pyélonéphrite) et initier un traitement pharmacologique *per os* de première intention pour la cystite chez une personne âgée de 14 ans et plus
- [OIPI-1022 Formulaire de liaison avec la pharmacie communautaire](#)

Soins infirmiers :

- Les infirmières doivent avoir pris connaissance du protocole médical national de l'INESSS [Initiation de mesures diagnostiques en présence de symptômes et signes suggestifs d'une infection urinaire \(cystite et pyélonéphrite\) et d'un traitement pharmacologique *per os* de première intention pour la cystite chez une personne âgée de 14 ans et plus](#).
- Suivre la formation ENA #18970 Initiation des mesures diagnostiques en présence de symptômes suggestifs d'une infection urinaire et initiation d'un traitement pharmacologique.
- Être certifiées pour l'utilisation des bandelettes urinaires en contexte d'examen de biologie médicale délocalisé (EBMD).

Merci de votre collaboration habituelle.

GL