

Note de service

DESTINATAIRES :	À tous les gestionnaires de personnel en soins infirmiers À toutes les infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires du CISSS de la Montérégie-Ouest
EXPÉDITEURS :	Filsan Abdi, conseillère en soins de plaies et stomathérapie Élyse Bériault, conseillère en soins, volet opération Émilie Bouchard, conseillère cadre au développement des pratiques professionnelles
DATE :	2021-10-08
OBJET :	Déploiement d'un aide-mémoire clinique sur l'utilisation des «Tubigrips »

Suite aux travaux d'harmonisation, le volet Conseil de la Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire propose un nouvel aide-mémoire afin d'encadrer la pratique des infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires quant à l'utilisation et le suivi des bandages de compression tubulaire « *Tubigrip* ».

Deux (2) aide-mémoires ont été développés afin de faciliter l'accès à l'information selon le champ de pratique du personnel concerné. L'un est destiné aux préposés aux bénéficiaires et l'autre aux infirmières et infirmières auxiliaires

- [AMC-DSIEU-6098 Préposés aux bénéficiaires – Bandages de compression tubulaire « Tubigrip ».](#)
- [AMC-DSIEU-6097 Infirmières et infirmières auxiliaires – Bandages de compression tubulaire « Tubigrip »](#)

À compter du 11 octobre 2021, les outils cliniques anciennement en vigueur dans les anciennes composantes seront annulés. Les nouveaux aide-mémoires sont déjà disponibles sur Intranet.

Les gestionnaires sont responsables de retirer les outils annulés de leur milieu et de bien diffuser l'information auprès de leurs équipes.

Annulation d'outils cliniques existants	
Secteurs	Annulation
✓ Jardins-Roussillon ✓ Suroît ✓ Haut-Saint-Laurent ✓ Vaudreuil-Soulanges	▪ Aide-mémoire Bandage de compression tubulaire : Tubigrip - Compression selon une charte : 5-10 mmHg/10-20 mmHg/20-30 mmHg, rédigé par le comité d'infirmières conseils du programme de soins de plaies CSSSJ (2009-08-11)

À noter que, désormais, un seul gradient de compression est possible avec l'utilisation des Tubigrips, soit 10-15 mmHg. Le guide des tailles et des mesures est donc simplifié.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux méthodes de soins informatisées (MSI) ainsi qu'aux conseillères en soins de plaies et infirmières cliniciennes, soutien à la pratique, de votre secteur.

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle

FA/EB/EB