

**INITIER DES ANALYSES DE DÉPISTAGE ET DE CONTRÔLE DE
STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTANT À LA METHICILINE (SARM)**

RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE : ☐ OUI ☒ NON

RÉFÉRENCE À UNE DIRECTIVE : ☐ OUI ☒ NON

PROFESSIONNELS VISÉS PAR L'ORDONNANCE

- Infirmières qui possèdent les connaissances et les compétences nécessaires.

GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE

- Personne admise ou inscrite.

INDICATIONS ET CONDITIONS

- Admission dans une chambre double en centre d'hébergement
- Admission en URFI / UTRF.
- Contact étroit ou élargi avec une personne connue colonisée ou infectée au SARM.
- Site connu colonisé ou infecté au SARM.

CONTRE-INDICATIONS

- Aucune.

INTENTION THÉRAPEUTIQUE OU OBJECTIF VISÉS

- Contrôler toute propagation de la bactérie multirésistante SARM dans nos établissements et inter-établissements.
- Permettre à la PCI de suivre l'évolution de la transmission du SARM.

LIMITE/ORIENTATION VERS LE MÉDECIN

- Signes d'infection à un site colonisé.
- Résultat positif chez une personne non connue colonisée ou infectée au SARM.

DIRECTIVES

- Procéder à l'examen clinique.
- Se référer aux «Mesures spécifiques en présence de bactéries multirésistantes (BMR) et du Clostridium difficile».
- Remplir le formulaire «Avis de dépistage ou de porteur d'une bactérie multirésistante ou autre infection».
- Consulter l'algorithme de dépistage et de contrôle de SARM en centre d'hébergement (annexe 1) ou en URFI et UTRF (annexe 2).
- Consulter l'algorithme de dépistage de SARM lors d'un diagnostique en cours de séjour (annexe 3).

Approuvée le	Révisée le

- Procéder au prélèvement :
 - Nasal : utiliser 1 seul écouvillon pour les deux narines.
 - Présence d'un autre site à risque :
 - Stomie : utiliser 1 écouvillon pour la peau au pourtour de la stomie
 - Plaie avec écoulement : utiliser 1 écouvillon par plaie
 - Sonde vésicale : utiliser 1 prélèvement pour culture d'urine

NB. : Le prélèvement de contrôle chez une personne connue colonisée ou infectée au SARM doit être retardé d'une (1) semaine post antibiotique (topique ou systémique).

MÉDECIN RÉPONDANT :

- Le médecin répondant mentionné sur le formulaire d'application de l'ordonnance sera le médecin traitant s'il est membre du CMDP de Vaudreuil-Soulanges. Autrement, il s'agira du médecin de garde.

ACTIVITÉS RÉSERVÉES DE L'INFIRMIÈRE

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.

RÉFÉRENCE AUX MÉTHODES DE SOINS

- Prélèvement des sécrétions du nez.
- Culture d'expectoration.
- Culture de plaies.
- Culture d'urine.

RÉFÉRENCE

- Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, 2006. Mesures spécifiques de prévention et de contrôle des infections en centre d'hébergement pour les personnes âgées, CLSC et domicile. SARM, ERV, Clostridium difficile.
- Institut national de santé publique du Québec, juin 2009. *Mesures de prévention et de contrôle des infections à Staphylococcus aureus résistant à la méthiciline (SARM) dans les milieux de réadaptation.*

Approuvée le	Révisée le

PROCESSUS D'ÉLABORATION

Rédigée par : Brigitte Duquette, conseillère-cadre en soins spécialisés et prévention des infections

Instances consultées :

Validée par :

Nom du médecin

Médecin associé au programme

Date

Nom de la présidente

Présidente du Comité pharmacologie (si médication impliquée)

Date

Nom de la directrice

Directrice des soins infirmiers, gestion des risques
et de la qualité et santé physique

Date

Nom du membre

Membre du Comité des ordonnances collectives

Date

PROCESSUS D'APPROBATION

Cette ordonnance collective a été adoptée par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CSSS de Vaudreuil-Soulanges


Nom de la présidente

Présidente


Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

Date

ALGORITHME DE DÉPISTAGE ET DE CONTRÔLE DE SARM EN HÉBERGEMENT



ALGORITHME DE DÉPISTAGE ET DE CONTRÔLE DE SARM EN URFI ET UTRF (4^E ÉTAGE CH VAUDREUIL)



ALGORITHME DE DÉPISTAGE DE SARM LORS D'UN DIAGNOSTIQUE EN COURS DE SÉJOUR

