

**DIRECTIVES POUR LA PRISE EN CHARGE DES
NOUVEAU-NÉS EN CONTEXTE COVID-19
Lors de réadmission / rebours**

Consignes : *Se référer à l'OC-6073 Effectuer un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par écouvillonnage oropharyngé et nasopharyngé ou par gargarisme*

RÉADMISSION

Pour toute réadmission d'un nouveau-né en provenance du domicile

→ Réadmission sans exposition potentielle ou contact étroit* :

- Si **asymptomatique** :
 - Procéder au dépistage systématique selon la **priorité M8** de l'OC-6073;
 - Compléter le formulaire CLI-60307;
 - Admettre à l'unité néonatale froide;

→ Réadmission **avec exposition potentielle** ou **contact étroit*** :

- **Absence de symptômes compatibles à la COVID-19** :
 - Procéder au dépistage systématique selon la **priorité M8** de l'OC-6073;
 - Compléter le formulaire CLI-60307;
 - Appliquer *Précautions additionnelles* selon les recommandations en vigueur;
 - Admettre dans une chambre fermée individuelle ou à l'unité néonatale tiède.
- **Présence de symptômes compatibles à la COVID-19** :
 - Procéder au dépistage systématique selon la **priorité M1** de l'OC-6073;
 - Compléter le formulaire CLI-60307;
 - Appliquer les *Précautions additionnelles* selon les recommandations en vigueur;
 - Admettre dans une chambre fermée individuelle ou à l'unité néonatale tiède.

→ **Ne pas oublier** de consigner au dossier les signes cliniques du nouveau-né, le suivi du résultat du dépistage ainsi que la mise à jour du PTI.

- * → **Questionner les parents pour déterminer leur statut en lien avec la COVID-19 (confirmé, suspecté ou sans facteur de risque). Utiliser le CLI-60341 pour guider votre évaluation.**
- Si les parents sont suspectés d'être atteints de la COVID-19, leur nouveau-né l'est également.

REBOURS

**Pour tous les nouveau-nés admis dans nos établissements
en provenance d'un autre centre hospitalier**

- Si **asymptomatiques** :
 - Procéder au dépistage systématique selon la **priorité M8** de l'OC-6073;
 - Compléter le formulaire CLI-60307;
 - Si l'établissement de provenance est en éclosion ou vigie, appliquer les *Précautions additionnelles Gouttelettes-contact-protection oculaire* pour une durée de 14 jours;
 - Admettre à l'unité néonatale froide;
 - Procéder au dépistage SARM, ERV et EPC-A à l'admission.
- Si **présence de symptômes compatibles à la COVID-19** :
 - Procéder au dépistage systématique selon la **priorité M1** de l'OC-6073;
 - Compléter le formulaire CLI-60307;
 - Appliquer les *Précautions additionnelles* selon les recommandations en vigueur
 - Admettre dans une chambre fermée individuelle ou à l'unité néonatale tiède.
 - Procéder au dépistage SARM, ERV et EPC-A selon la procédure habituelle.

Hôpital Anna-Laberge : Procéder au dépistage systématique selon la **priorité M8** de l'OC-6073 pour les mères qui vont utiliser l'entre-deux.

→ **Ne pas oublier** de consigner au dossier les signes cliniques du nouveau-né, le suivi du résultat du dépistage ainsi que la mise à jour du PTI.