

OIPI-1001 Maturation cervicale/déclenchement du travail au misoprostol

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valide du _____ à 00:00 au _____ à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant MISOPROSTOL 50 mcg caps prostaglandines 50 mcg = 1 capsule par la bouche aux 4 heures x _____ doses Déglutir vite. Cesser lorsque col favorable ou travail actif Manipuler avec gants si infirmière enceinte ou allaitement Maximum : 6 doses (300 mcg) OIPI-1001 Maturation cervicale/déclenchement du travail au misoprostol nausées et vomissements-diarrhée-flatulence-douleurs abdominales		Voie d'adm. PO DVI _____ DVI _____	DVI _____ DVI _____	DVI _____ DVI _____
MISOPROSTOL 50 mcg caps prostaglandines 50 mcg = 1 capsule par la bouche aux 2 heures x _____ doses Déglutir vite. Cesser lorsque col favorable ou travail actif Manipuler avec gants si infirmière enceinte ou allaitement Maximum : 6 doses (300 mcg) OIPI-1001 Maturation cervicale/déclenchement du travail au misoprostol nausées et vomissements-diarrhée-flatulence-douleurs abdominales		DVI _____ DVI _____ DVI _____ DVI _____	DVI _____ DVI _____ DVI _____ DVI _____	DVI _____ DVI _____ DVI _____ DVI _____
Init.: _____ Heure: _____	Apposer l'étiquette de la pharmacie et vos initiales OU écrire la nouvelle ordonnance et vos initiales.			

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque