

Hôpital du Suroît

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergies:

Dossier:

Sexe:

Intolérance(s):

Poids (kg):

Remarques:

Taille (cm):

*** Valide du Nom générique du médicament/nom commercial courant	Voie d'adm.	(00:00-07:59)	(08:00-15:59)	(16:00-23:59)
SODIUM CHLORURE 0,9 % 1 L soluté (NaCl) en perf.IV continue selon ordonnance OIPI-610 Syndrome coronarien aigu Début : Fin :	IV			
soluté en perfusion continue IV selon ordonnance OIPI-610 Syndrome coronarien aigu irritation locale-sensation de brûlure Début : Fin :	IV			
SODIUM CHLORURE 0,9% inj. ser. 10 mL (Salin-lock) Irrigation cathéter selon procédure soins infirmiers Ser 10 mL température pièce Au commun OIPI-610 Syndrome coronarien aigu irritation locale-sensation de brûlure Début : Fin :	IV			
AAS 80 mg co croquable (ASAPHEN) 320 MG = 4 comprimé(s) STAT si non déjà reçu Croquer et avaler Avec repas ou collation OIPI-610 Syndrome coronarien aigu dyspepsie-hémorragie-douleurs épigastriques-nausées Début : Fin :	PO			
AAS 80 mg co enrobe (Aspirin enrobe) 81 MG = 1 comprimé(s) 1 fois par jour Espacer d'1h(lait/antiacide) Ne pas écraser / ni croquer OIPI-610 Syndrome coronarien aigu dyspepsie-hémorragie-douleurs épigastriques-nausées Début : Fin :	PO		08:30 _____	

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

Hôpital du Suroit

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Dossier:

Intolérance(s):

Sexe:

Poids (kg):

Remarques:

Taille (cm):

*** Valable du Dimanche 05 Mars 2023 à 00:00 au Dimanche 05 Mars 2023 à 23:59 ***		(00:00-07:59)	(08:00-15:59)	(16:00-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant	Voie d'adm.			
CLOPIDOGREL 75 mg co (Plavix) 300 MG = 4 comprimé(s) STAT Peut être coupé, écrasé ou croqué OIPI-610 Syndrome coronarien aigu nausees,vomissement,diarr-céphalées-etourdissement-rash Début : Fin :	PO			
CLOPIDOGREL 75 mg co (Plavix) 75 MG = 1 comprimé(s) 1 fois par jour Peut être coupé, écrasé ou croqué OIPI-610 Syndrome coronarien aigu nausees,vomissement,diarr-céphalées-etourdissement-rash Début : Fin :	PO		08:30 _____	
TICAGRELOR 90 mg co (Brilinta) 180 MG = 2 comprimé(s) STAT Peut être écrasé et mêler avec de l'eau Médicament d'exception RAMQ: code CV161 OIPI-610 Syndrome coronarien aigu hemorragie-céphalées-fibrillation auriculaire-aug.de la créatinine Début : Fin :	PO			
TICAGRELOR 90 mg co (Brilinta) 90 MG = 1 comprimé(s) au déjeuner et au coucher Peut être écrasé et mêler avec de l'eau Médicament d'exception RAMQ: code CV161 OIPI-610 Syndrome coronarien aigu hemorragie-céphalées-fibrillation auriculaire-aug.de la créatinine Début : Fin :	PO		08:30 _____	21:00 _____
DEXLANSOPRAZOLE 30 mg caps (Dexilant) 30 MG = 1 capsule(s) 1 fois par jour On peut ouvrir cap,ne pas écraser granules Peut être pris à jeun ou en mangeant Médicament d'exception RAMQ: code PP12 OIPI-610 Syndrome coronarien aigu diarrhee-douleurs abdominales-nausees et vomissements-flatulence Début : Fin :	PO		08:30 _____	

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque



FEUILLE D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS (FADM)-24 heures

CISSMO SUROIT

Hôpital du Suroit

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Dossier:

Intolérance(s):

Sexe:

Poids (kg):

Remarques:

Taille (cm):

*** Valable du Dimanche 05 Mars 2023 à 00:00 au Dimanche 05 Mars 2023 à 23:59 ***		(00:00-07:59)	(08:00-15:59)	(16:00-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant	Voie d'adm.			
POLYETHYLENEGLYCOL pd 510g (Lax-a-day) PO 17 g per os 1 fois par jour si constipation Dil. ds 250ml d'eau,jus,café,thé,boisson gaz. Utiliser le godet-doseur ds le bouchon Contre-indiqué aux patients dysphagiques aux liquides clairs OIPI-610 Syndrome coronarien aigu Début : Fin :	Commun	prn	prn	prn
NITROGLYCERINE pulv./0.4 mg (Nitrolingual Pulv.) S.LING pulveriser sur/sous langue aux 5 min x 3 doses si DRS et si TAS supérieure ou égale à 100 mmHg Ne pas agiter OIPI-610 Syndrome coronarien aigu tachycardie-hypotension-céphalées-etourdissement Début : Fin :	Commun	prn	prn	prn
MORPHINE 10 mg/mL 1 mL sol.inj. IV 3 à 5 MG = 0.3 à 0.5 mL IV tubulure aux 5 à 10 min. X3 doses si DRS non soulagées par nitro et TAS égale ou supérieure à 100 mmHg Compléter ad 10mL de NS Administrer lentement (max 3 mg/min) Aviser MD si non soulagé par morphine ou si récurrence DRS Narco sous clé OIPI-610 Syndrome coronarien aigu oedeme angioneurotique-nausees et vomissements-etourdissement-**INSC ANALG SI REQ... Début : Fin :		prn	prn	prn
MORPHINE 10 mg/mL 1 mL sol.inj. (Morphine) SC 3 à 5 MG = 0.3 à 0.5 mL sous-cutané aux 4 heures si douleur Si non reçu PO narco sous clé ORD-610 Syndrome coronarien aigu oedeme angioneurotique-nausees et vomissements-etourdissement-**INSC ANALG SI REQ... Début : Fin :		prn	prn	prn

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

Hôpital du Suroît

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Dossier:

Intolérance(s):

Sexe:

Remarques:

Poids (kg):

Taille (cm):

*** Valide du		(00:00-07:59)	(08:00-15:59)	(16:00-23:59)	
Nom générique du médicament/nom commercial courant		Voie d'adm.			
MORPHINE 5 mg co (Statex) 5 à 10 MG = 1 à 2 comprimé(s) par la bouche aux 4 heures si douleur si non reçu scut. Peut être coupé ou écrasé Narco sous clé OIPI-610 Syndrome coronarien aigu oedeme angioneurotique-nausees et vomissements-etourdissement- **INSC ANALG SI REQ... Début : Fin :		PO	prn	prn	prn
NITROGLYCERINE 50 mg /250 mL D5% bout. 50 MG = 250 mL IV perfusion D buter à 3 mL/h si DRS non soulagées par nitro sublinguale Augmenter de 3 ml/h aux 5-10 min ad soulagement ou chute de TAS inférieure à 90 mmHg. Débit max:45 mL/h *exclusif USI et salle réanim* Protéger de la lumière pour entreposage seul. Utiliser avec dispositif ventilé et tubulure 14242 OIPI-610 Syndrome coronarien aigu tachycardie-hypotension-céphalées-etourdissement Début : Fin :		IV			
ATROPINE 0,4 mg/mL inj. 1 mL 0.5 MG = 1,25 mL IV tubulure STAT & répétable x 1 après 5 min. si bradycardie persiste (RC inférieur à 45 batt/min et symptomatique) Injecter en 30 à 60 secondes Aviser médecin **Exclusif salle de réanimation et soins intensifs** OIPI-610 Syndrome coronarien aigu troubles visuels-secheresse de la bouche-tachycardie-retention urinaire Début : Fin :		IV	prn	prn	prn
Init.: _____ Heure: _____	Apposer l'étiquette de la pharmacie et vos initiales OU écrire la nouvelle ordonnance et vos initiales.				

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

Hôpital du Suroît

Nom, Prénom:

Chambre:

Dossier:

Allergie(s):

Sexe:

Intolérance(s):

Poids (kg):

Remarques:

Taille (cm):

*** Valide du		(00:00-07:59)	(08:00-15:59)	(16:00-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant		Voie d'adm.		
Init.: _____ Heure: _____	Apposer l'étiquette de la pharmacie et vos initiales OU écrire la nouvelle ordonnance et vos initiales.			
Init.: _____ Heure: _____	Apposer l'étiquette de la pharmacie et vos initiales OU écrire la nouvelle ordonnance et vos initiales.			

Vérifié avec profil : _____ Le : _____

Signature(s) Init(s)		Signature(s) Init(s)		Signature(s) Init(s)	

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque