

OIPI-610 Syndrome coronarien aigu

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valable du	à 00:00 au	à 23:59 ***	(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
VERIFICATION TIMBRE(S) OIPI-610 Syndrome coronarien aigu Vérifiez et inscrivez la présence(p) ou l'absence(a) des timbres 1 fois par quart de travail Inscrivez le nom du timbre à vérifier Corrigez l'heure de la vérification prn ASSUREZ-VOUS DE RETIRER L'ANCIEN TIMBRE AVANT D'EN APPLIQUER UN NOUVEAU OIPI-610 Syndrome coronarien aigu			06:00	11:00	21:00
TICAGRELOR 90 mg co (Brilinta) OIPI-610 Syndrome coronarien aigu 180 MG = 2 comprimé(s) par la bouche STAT Peut être écrasé et mêler avec de l'eau Médicament d'exception RAMQ: code CV161 OIPI-610 Syndrome coronarien aigu hemorrhagie-céphalées-fibrillation auriculaire-aug.de la créatinine			PO Cabinet		
TICAGRELOR 90 mg co (Brilinta) OIPI-610 Syndrome coronarien aigu 90 MG = 1 comprimé(s) par la bouche au déjeuner et au coucher Peut être écrasé et mêler avec de l'eau Médicament d'exception RAMQ: code CV161 OIPI-610 Syndrome coronarien aigu hemorrhagie-céphalées-fibrillation auriculaire-aug.de la créatinine			PO Cabinet	08:30	21:00
ENOXAPARINE mg/ mL ser. (Noromby) OIPI-610 Syndrome coronarien aigu 2 fois par jour Région latérale de l'abdomen Ne pas expulser l'air si la seringue complète est utilisée AJUSTER LA DOSE AVANT D'ADMINISTRER SI REQUIS OIPI-610 Syndrome coronarien aigu nausees et vomissements-urticaire-fievre-hemorragie			SC 	09:00 DVI	21:00 DVI

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

OIPI-610 Syndrome coronarien aigu

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Allergie(s):

Intolérance(s):

Remarques:

Chambre:

Dossier:

Sexe:

Poids (kg):

Taille (cm):

Naissance:

RAMQ:

Créat.:

Cl creat. :

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant			Voie d'adm.			
CLOPIDOGREL 75 mg co (Plavix)			PO			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu			Cabinet			
anti-plaquettaires						
300 MG = 4 comprimé(s) par la bouche						
STAT						
Peut être coupé, écrasé ou croqué						
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
nausees,vomissement,diarr-céphalées-etourdissement-rash						
CLOPIDOGREL 75 mg co (Plavix)			PO			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu			Cabinet			
anti-plaquettaires						
75 MG = 1 comprimé(s) par la bouche						
1 fois par jour						
Peut être coupé, écrasé ou croqué						
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
nausees,vomissement,diarr-céphalées-etourdissement-rash						
ATORVASTATINE mg co (Lipitor)			PO			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
inh.HMG-CoA réductase						
MG = 1 comprimé(s) par la						
au coucher						
Peut être coupé ou écrasé						
Eviter jus de pamplemousse						
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
diarrhee-céphalées-douleurs epigastriques-rash						
ROSUVASTATINE mg co (Crestor)			PO			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
inh.HMG-CoA réductase						
MG = 1 comprimé(s) par la bouche						
au coucher						
Peut être coupé ou écrasé						
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
myalgie-céphalées-asthenie-nausees						
NITROGLYCERINE mg/h timbre (Nitro-Dur)			Topique			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu			Cabinet			
nitrates						
MG = 1 timbre(s)						
1 fois par jour de 8:00 à 20:00 ***RETRAIT A 20:00***						
Rotation des sites Site met: _____						
Site ôte: _____						
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
tachycardie-hypotension-céphalées-etourdissement						

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.

⚠ Précautions lors de la manipulation

⚠ Précautions grossesse et allaitement

⚠ Cytotoxique

⚠ Haut risque

OIPI-610 Syndrome coronarien aigu

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant			Voie d'adm.			
METOPROLOL mg co (Lopresor)			PO			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu inh. beta-adrénergiques			Cabinet		08:30	21:00
MG = 1 comprimé(s) par la bouche 2 fois par jour SI FC supérieure à batt/min et TAS supérieure à mmHg Peut être coupé ou écrasé OIPI-610 Syndrome coronarien aigu fatigue-etourdissement-insomnie-nausees						
BiSOPROlol mg co (Monacor)			PO			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu inh. beta-adrénergiques			Cabinet		08:30	
MG = 1 comprimé(s) par la bouche 1 fois par jour SI FC supérieure à batt/min et TAS supérieure à mmHg Peut être coupé ou écrasé Le produit a mauvais goût si pas pris en entier OIPI-610 Syndrome coronarien aigu bradycardie-fatigue-nausees						
ATENOLOL mg co (Tenormin)			PO			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu inh. beta-adrénergiques					08:30	
MG = 1 comprimé(s) par la bouche 1 fois par jour si FC supérieure à batt/min et et TAS supérieure à mmHg Peut être coupé ou écrasé OIPI-610 Syndrome coronarien aigu bradycardie-fatigue-nausees-hypotension orthostatique						
TRANDOLAPRIL mg caps (Mavik)			PO			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu IECA					08:30	
MG = 1 capsule(s) par la bouche 1 fois par jour SI TAS supérieure à mmHg OIPI-610 Syndrome coronarien aigu oedeme angioneurotique-diarrhee-hyperkaliemie-toux						
RAMIPRIL mg caps (Altace)			PO			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu IECA			Cabinet		08:30	
MG = 1 capsule(s) par la bouche 1 fois par jour SI TAS supérieure à mmHg Capsule peut être ouverte OIPI-610 Syndrome coronarien aigu céphalées-etourdissement-toux-eruption cutanee D						

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

OIPI-610 Syndrome coronarien aigu

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Allergie(s):

Intolérance(s):

Remarques:

Chambre:

Dossier:

Sexe:

Poids (kg):

Taille (cm):

Naissance:

RAMQ:

Créat.:

CI creat. :

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant			Voie d'adm.			
PERINDOPRIL mg co (Coversyl)			PO		08:30	
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu			IECA			
MG = 1 comprimé(s) par la bouche						
1 fois par jour Si TAS supérieure à mmHg						
Peut être coupé ou écrasé						
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
céphalées-rash-toux-hypotension						
AAS 80 mg co croquable (ASAPHEN)			PO			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu			Cabinet			
320 MG = 4 comprimé(s) par la bouche						
STAT si non déjà reçu						
Croquer et avaler						
Avec repas ou collation						
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
dyspepsie-hémorragie-douleurs épigastriques-nausées						
AAS 80 ou 81 mg co enrobe (Aspirin enrobe)			PO		08:30	
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu			AINS			
81 MG = 1 comprimé(s) par la bouche						
1 fois par jour						
Espacer d'1h(lait/antiacide)						
Ne pas écraser ni croquer						
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
dyspepsie-hémorragie-douleurs épigastriques-nausées						
SODIUM CHLORURE 0,9 % 1 L soluté (NaCl)			IV			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu			agents suppléance			
en perf.IV continue						
TVO						
Servi par le magasin						
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
irritation locale-sensation de brûlure						
SODIUM CHLORURE 0,9 % 1 L soluté (NaCl)			IV			
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu			agents suppléance			
mL/h en perfusion IV						
Servi par le magasin						
OIPI-610 Syndrome coronarien aigu						
irritation locale-sensation de brûlure						

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.

⚠ Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

OIPI-610 Syndrome coronarien aigu

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant			Voie d'adm.			
SODIUM CHLORURE 0,9% inj. ser.3 mL (Salin-lock) OIPI-610 Syndrome coronarien aigu agents suppléance 2 ML IV aux 12 heures minimum pour cathéter veineux Ser 5mL temperature piece Au commun Utiliser 4mL pour adaptateur long OIPI-610 Syndrome coronarien aigu irritation locale-sensation de brulure			IV			
DEXLANSOPRAZOLE 30 mg caps (Dexilant) OIPI-610 Syndrome coronarien aigu inh. pompe protons 30 MG = 1 capsule(s) par la bouche 1 fois par jour Capsule peut s'ouvrir, ne pas écraser les granules Peut être pris à jeun ou en mangeant Médicament d'exception RAMQ: code PP12 OIPI-610 Syndrome coronarien aigu diarrhee-douleurs abdominales-nausees et vomissements-flatulence			PO Cabinet		08:30	
ATROPINE 0,6 mg/mL inj. 1 mL OIPI-610 Syndrome coronarien aigu antispasmodiques/antimuscariniques 0.5 MG = 0.83 mL IV direct STAT et répétable x 1 après 5 min. si bradycardie persiste Injecter en 1 minute RC inférieur à 45 batt/min et symptomatique Aviser médecin **Exclusif salle de réanimation et soins intensifs** OIPI-610 Syndrome coronarien aigu troubles visuels-sécheresse de la bouche-tachycardie-rétention urinaire			IV Cabinet 	prn	prn	prn
NITROGLYCERINE pulv./0,4 mg (Nitrolingual Pulv.) OIPI-610 Syndrome coronarien aigu nitrates pulvériser sur/sous langue aux 5 min x 3 doses si DRS et si TAS supérieure ou égale à 100 mmHg Ne pas agiter OIPI-610 Syndrome coronarien aigu tachycardie-hypotension-céphalées-etourdissement			S.LING Cabinet	prn	prn	prn

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

OIPI-610 Syndrome coronarien aigu

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Allergie(s):

Intolérance(s):

Remarques:

Naissance:

RAMQ:

Créat.:

CI creat. :

Chambre:

Dossier:

Sexe:

Poids (kg):

Taille (cm):

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant			Voie d'adm.			
NITROGLYCERINE 50 mg /250 mL D5% bout. OIPI-610 Syndrome coronarien aigu 50 MG = 250 mL IV perfusion Débuter à 3 mL/h si DRS non soulagées par nitro sublinguale Augmenter de 3 mL/h aux 5 à 10min ad soulagement ou chute de TAS inférieure à 90 mmHg. Débit max:45 mL/h *exclusif USI et salle réanim* Protéger de la lumière pour entreposage seul. Utiliser avec dispositif ventilé et tubulure 14242 OIPI-610 Syndrome coronarien aigu tachycardie-hypotension-céphalées-etourdissement			IV Cabinet	prn	prn	prn
MORPHINE 10 mg/mL 1 mL sol.inj. OIPI-610 Syndrome coronarien aigu 3 à 5 MG = 0.3 à 0.5 mL IV direct aux 5 à 10 min x 3 doses si DRS non soulagées par nitro et TAS égale ou supérieure à 100 mmHg Compléter ad 10 mL avec NS administrer lentement en 3 mg/min Aviser médecin si soulagé par morphine ou si récive DRS Narco sous clé ORD-610 Syndrome coronarien aigu oedeme angioneurotique-nausees et vomissements-etourdissement-**INSC ANALG SI REQ...			IV Cabinet	prn	prn	prn
MORPHINE 10 mg/mL 1 mL sol.inj. (Morphine) OIPI-610 Syndrome coronarien aigu 3 à 5 MG = 0.3 à 0.5 mL sous-cutané aux 4 heures si douleur Si non reçu PO narco sous clé ORD-610 Syndrome coronarien aigu oedeme angioneurotique-nausees et vomissements-etourdissement-**INSC ANALG SI REQ...			SC Cabinet	prn	prn	prn
MORPHINE 5 mg co (Statex) OIPI-610 Syndrome coronarien aigu 5 à 10 MG = 1 à 2 comprimé(s) par la bouche aux 4 heures si douleur Si non reçu s-cut. Peut être coupé ou écrasé Narco sous clé OIPI-610 Syndrome coronarien aigu oedeme angioneurotique-nausees et vomissements-etourdissement-**INSC ANALG SI REQ...			PO Cabinet	prn	prn	prn

(R) Refus (EX) Examen (SO) Salle d'opération (AA) Auto-administration (AR) Autre raison (détailler)
 Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.

⚠ Précautions lors de la manipulation ⚠ Précautions grossesse et allaitement ⚠ Cytotoxique ⚠ Haut risque

OIPI-610 Syndrome coronarien aigu

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valable du		à 00:00 au	à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant		Voie d'adm.					
POLYETHYLENEGLYCOL pd 510g (Lax-a-day) OIPI-610 Syndrome coronarien aigu 17 g par la bouche 1 fois par jour si constipation Diluer avec 125 à 250 mL de liquide ou compote Utiliser le godet-doseur ds le bouchon Produit ne s'épaissi pas OIPI-610 Syndrome coronarien aigu		laxatifs/purgatifs Commun		PO	prn	prn	prn
Init.: _____							
Heure: _____							
Apposer l'étiquette de la pharmacie et vos initiales OU écrire la nouvelle ordonnance et vos initiales.							

FADM vérifiée par : _____ Le : _____

Signature(s)	Init(s)	Signature(s)	Init(s)	Signature(s)	Init(s)

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque