

OIPI-621 Post-opératoire chirurgie urologique

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant			Voie d'adm.			
TAMSULOSINE 0,4 mg co CR (Flomax CR)			PO			17:00
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique alpha-adrenergiques bloquants 0.4 MG = 1 comprimé(s) par la bouche 1 fois par jour Ne pas écraser / ni croquer OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique diarrhee-rhinite-céphalées-etourdissement						
TAMSULOSINE 0,4 mg caps LA (Flomax)			PO			17:00
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique alpha-adrenergiques bloquants 0.4 MG = 1 capsule(s) par la bouche 1 fois par jour Avec repas ou collation Ouvrir cap, ne pas écraser les granules En remplacement du tamsulosine CR car ne s'écrase pas OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique diarrhee-rhinite-céphalées-etourdissement						
SODIUM CHLORURE 0,9% inj. ser.3 mL (Salin-lock)			IV			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique agents suppléance 2 ML IV aux 12 heures minimum pour cathéter veineux Ser 5mL temperature piece Disponible au magasin Utiliser 4mL pour adaptateur long OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique irritation locale-sensation de brulure						
LACTATE RINGER 1000 mL inj.			IV			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique agents suppléance ___ mL/h en perfusion IV Quand PO toléré: cesser soluté Aviser pharmacie via la feuille de communication OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique						
DEXTROSE 5%-NACL 0,45% 1000 mL inj. (D5%-1/2S)			IV			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique agents calorifiques ___ mL/h en perfusion IV Quand PO toléré: cesser soluté Aviser pharmacie via la feuille de communication OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique						

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

OIPI-621 Post-opératoire chirurgie urologique

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Allergie(s):

Intolérance(s):

Remarques:

Chambre:

Dossier:

Sexe:

Poids (kg):

Taille (cm):

Naissance:

RAMQ:

Créat.:

CI creat. :

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant			Voie d'adm.			
NAPROXEN 500 mg co (Naprosyn)			PO			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique				prn	prn	prn
AINS						
500 MG = 1 comprimé(s) par la bouche						
2 fois par jour si douleur						
Avec repas ou collation						
Peut être coupé ou écrasé						
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique						
constipation-céphalées-douleurs épigastriques-douleurs abdominales						
INDOMETHACINE 100 mg supp (Indocid)			IR			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique				prn	prn	prn
AINS						
100 MG = 1 supp. intrarectal						
2 fois par jour si douleur						
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique						
nausees et vomissements-dyspepsie-céphalées-etourdissement						
oxyCODONE 10 mg supp. (Rupture de stock) (Supeudol)			IR			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique				prn	prn	prn
agonistes opiacés						
10 MG = 1 supp. intrarectal						
aux 6 heures si spasmes vésicaux						
Si autre opioïde non reçu						
Narco sous clé						
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique						
confusion-sédation-etourdissement-**INSC ANALG SI REQUIS**						
MORPHINE 5 mg co (Statex)			PO			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique			Cabinet	prn	prn	prn
agonistes opiacés						
___ MG = 1 comprimé(s) par la bouche						
aux 4 heures si douleur						
Si non reçu s-cut.						
Peut être coupé ou écrasé						
Narco sous clé						
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique						
oedème angioneurotique-nausees et vomissements-etourdissement-						

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.

⚠ Précautions lors de la manipulation

⚠ Précautions grossesse et allaitement

⚠ Cytotoxique

⚠ Haut risque

OIPI-621 Post-opérateur chirurgie urologique

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

RAMQ:

Sexe:

Intolérance(s):

Créat.:

Poids (kg):

Remarques:

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valable du à 00:00 au à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant	Voie d'adm.			
HYDROmorphone mg co (Dilaudid) OIPI-621 Postopérateur chirurgie urologique agonistes opiacés MG = comprimé(s) par la bouche aux 4 heures si douleur Si non reçu s-cut. Peut être coupé ou écrasé Narco sous clé OIPI-621 Postopérateur chirurgie urologique nausées et vomissements-somnolence-etourdissement-	PO Cabinet	prn	prn	prn
HYDROmorphone 2 mg/mL sol. inj. 1mL (Dilaudid) OIPI-621 Postopérateur chirurgie urologique agonistes opiacés MG = mL sous-cutané aux 4 heures si douleur Si non reçu PO Narco sous clé OIPI-621 Postopérateur chirurgie urologique nausées et vomissements-somnolence-etourdissement-	SC Cabinet	prn	prn	prn
MORPHINE 10 mg/mL 1 mL sol.inj. OIPI-621 Postopérateur chirurgie urologique agonistes opiacés MG = mL sous-cutané aux 4 heures si douleur Si non reçu PO Narco sous clé Jeter toute portion restante OIPI-621 Postopérateur chirurgie urologique oedème angioneurotique-nausées et vomissements-etourdissement-	SC Cabinet	prn	prn	prn
ACETAMINOPHENE mg co (Tylenol) OIPI-621 Postopérateur chirurgie urologique analgésiques,antipyrétiques divers MG = 2 comprimé(s) par la bouche aux 4 à 6 heures si douleur Si non reçu IR Max: 4 g d'acétaminophène / 24 h Peut être coupé ou écrasé OIPI-621 Postopérateur chirurgie urologique urticaire-rash-dommages hépatiques	PO Commun	prn	prn	prn

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

OIPI-621 Post-opératoire chirurgie urologique

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Allergie(s):

Intolérance(s):

Remarques:

Chambre:

Dossier:

Sexe:

Poids (kg):

Taille (cm):

Naissance:

RAMQ:

Créat.:

CI creat. :

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant			Voie d'adm.			
ACETAMINOPHENE 650 mg supp. (Tylenol)			IR			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique			Cabinet	prn	prn	prn
analgésiques, antipyrétiques divers						
MG = supp. intrarectal						
aux 4 à 6 heures si douleur						
Si non reçu PO						
Max: 4 g d'acétaminophène / 24 h						
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique						
urticaire-rash-dommages hépatiques						
ONDANSETRON 4 mg co (Zofran)			PO			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique				prn	prn	prn
anti-émétiques						
4 à 8 MG = 1 à 2 comprimé(s) par la bouche						
aux 6 heures si nausée persiste 30 min après dimenhyDRINATE						
Si non reçu IV						
Peut être dilué dans eau ou jus						
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique						
nausées et vomissements-constipation-céphalées-sympt. extra-pyramidaux						
ONDANSETRON 4 mg/2 mL sol. inj. (Zofran)			IV			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique				prn	prn	prn
anti-émétiques						
4 à 8 MG = 2 à 4 mL IV via mini-perfuseur						
aux 6 heures si nausée persiste 30 min après dimenhyDRINATE						
Rediluer ad 20 mL avec NaCl 0,9% et administrer en 15 minutes						
Si non reçu PO						
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique						
nausées et vomissements-constipation-céphalées-sympt. extra-pyramidaux						
dimenhyDRINATE 50 mg co (Gravol)			PO			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique			Cabinet	prn	prn	prn
anti-émétiques antihistaminiques						
25 à 50 MG = 1/2 à 1 comprimé(s) par la bouche						
aux 6 heures si nausées						
Si non reçu IV						
Max: 400 mg / 24 h						
Peut être coupé ou écrasé						
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique						
vision brouillée-somnolence-céphalées-						
dimenhyDRINATE 50 mg/ mL inj. 1 mL (Gravol)			IV			
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique			Cabinet	prn	prn	prn
anti-émétiques antihistaminiques						
25 à 50 MG = 0.5 à 1 mL IV direct						
aux 6 heures si nausées ou vomissements						
Rediluer ad 10 mL avec NaCl 0,9% et administrer en 2						
Si non reçu PO						
Max: 400 mg / 24 h						
OIPI-621 Postopératoire chirurgie urologique vision						
brouillée-somnolence-céphalées-						

(R) Refus (EX) Examen (SO) Salle d'opération (AA) Auto-administration (AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.

 Précautions lors de la manipulation  Précautions grossesse et allaitement  Cytotoxique  Haut risque

OIPI-621 Post-opérateur chirurgie urologique

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valable du		à 00:00 au		à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant						Voie d'adm.		
METOCLOPRAMIDE 10 mg/2 mL inj. (Maxeran) OIPI-621 Postopérateur chirurgie urologique 10 MG = 2 mL IV direct aux 6 heures si nausées persistent 30 min après ondansétron Administrer lentement en 1 à 2 minutes OIPI-621 Postopérateur chirurgie urologique agitation-somnolence-fatigue-sympt. extra-pyramidaux						IV Cabinet	prn	prn
Init.: _____								
Heure: _____								
Apposer l'étiquette de la pharmacie et vos initiales OU écrire la nouvelle ordonnance et vos initiales.								

FADM vérifiée par : _____ Le : _____

Signature(s)	Init(s)	Signature(s)	Init(s)	Signature(s)	Init(s)

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque