

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant			Voie d'adm.			
ceFAZoline 2 g seringue (SCAS) (Ancef)			IV			
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx cephalosporines						
2 G = 20 mL IV pousse-seringue						
a l'induction (terminer l'adm. 60 min avant incision)						
Via pousse-ser. en 30 min ou IV direct en 3 à 5 minutes						
Pour usager de moins de 120 kg						
Préparé à la pharmacie / Réfrigérer						
OIPI-721 Prothèse unicompartimentale du genou						
nausée,vomissement,diarr-colite pseudomembraneuse-phlébite-rash						
ceFAZoline 1 g pd inj. (Ancef)			IV			
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx cephalosporines Commun						
3 G = 30 mL via minisac						
à l'induction (terminer l'adm. ds les 60 min avant incision)						
Diluer chaque fiole avec 9,5mL d'eau stérile						
Dans 100 mL NaCl 0,9% en 45 minutes						
Pour usager de 120 kg et plus						
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires						
nausée,vomissement,diarr-colite pseudomembraneuse-phlébite-rash						
VANCOMYCINE 1 g pdre inj.fiole (adulte) (Vancocin)			IVperf			
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx antibiotériens autres						
1 G = 20 mL via soluté sous pompe						
en pré-opératoire						
Reconstituer la fiole avec 20 mL d'eau stérile						
Diluer dans 250 mL D5% ou NaCl 0,9% en 90 minutes						
Commencer et terminer l'adm dans les 120min avant l'incision						
Si allergie sévère à céfazoline ou porteur de SARM						
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires						
nausées et vomissements-ototoxicité-néphrotoxicité-dommages hépatiques						
VANCOMYCINE 1 g pdre inj.fiole (adulte) (Vancocin)			IVperf			
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx antibiotériens autres						
1.25 G = 25 mL via soluté sous pompe						
en pré-opératoire						
Reconstituer la fiole avec 20 mL d'eau stérile						
Diluer dans 250 mL D5% ou NaCl 0,9% en 90 minutes						
Commencer et terminer l'adm dans les 120min avant l'incision						
Si allergie sévère à céfazoline ou porteur de SARM						
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires						
nausées et vomissements-ototoxicité-néphrotoxicité-dommages hépatiques						

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valide	à 00:00 au	à 23:59 ***		(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant			Voie d'adm.			
VANCOMYCINE 1 g pdre inj.fiole (adulte) (Vancocin)			IVperf			
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx			antibacteriens autres			
1,5 G = 30 mL via soluté sous pompe en pré-opératoire						
Reconstituer la fiole avec 20 mL d'eau stérile						
Diluer dans 250 mL D5% ou NaCl 0,9% en 120 minutes						
Commencer et terminer l'adm dans les 120min avant l'incision						
Si allergie sévère à céfazoline ou porteur de SARM						
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires						
nausées et vomissements-ototoxicité-néphrotoxicité-dommages hépatiques						
VANCOMYCINE 1 g pdre inj.fiole (adulte) (Vancocin)			IVperf			
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx			antibacteriens autres			
1,75 G = 35 mL via soluté sous pompe en pré-opératoire						
Reconstituer la fiole avec 20mL d'eau stérile						
Diluer dans 500 mL D5% ou NaCl 0,9% en 120 minutes						
Commencer et terminer l'adm dans les 120min avant l'incision						
Si allergie sévère à céfazoline ou porteur de SARM						
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires						
nausées et vomissements-ototoxicité-néphrotoxicité-dommages hépatiques						
VANCOMYCINE 1 g pdre inj.fiole (adulte) (Vancocin)			IVperf			
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx			antibacteriens autres			
2 G = 40 mL via soluté sous pompe en pré-opératoire						
Reconstituer la fiole avec 20 mL d'eau stérile						
Diluer dans 500 mL D5% ou NaCl 0,9% en 120 minutes						
Commencer et terminer l'adm dans les 120min avant l'incision						
Si allergie sévère à céfazoline ou porteur de SARM						
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires						
nausées et vomissements-ototoxicité-néphrotoxicité-dommages hépatiques						
TRANEXAMIQUE AC 100 mg/mL sol. inj fiole (CYKLOKAPRON)			IV			
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx			hémostatiques			
___MG = ___ mL IV via à l'induction						
Dose 15 mg/kg avec un maximum de 1g						
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires						
nausée,vomissement,diarr-étourdissement-hypotension						

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.

⚠ Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

Cl creat. :

Taille (cm):

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***	(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant			Voie d'adm.		
TRANEXAMIQUE AC 100 mg/mL sol. inj fiole (CYKLOKAPRON)			IV		
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx			hémostatiques		
MG = mL IV via minisac					
pour 1 dose avant la fermeture du site opératoire					
Dose 15 mg/kg avec un maximum de 1g					
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires					
nausée, vomissement, diarr-étourdissement-hypotension					
CELECOXIB 200 mg caps. (Celebrex)			PO		
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx			AINS Commun		
200 MG = 1 capsule(s) par la bouche					
pour 1 dose 1 à 2 h avant la chirurgie					
Administer avec repas ou collation					
Capsule peut être ouverte					
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires					
céphalées-rash-douleurs abdominales					
ACETAMINOPHENE 500 mg co (Tylenol)			PO		
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx			analgésiques, antipyrétiques divers Commun		
1000 MG = 2 comprimé(s) par la bouche					
pour 1 dose 1 à 2 h avant la chirurgie					
Max: 4 g d'acétaminophène / 24 h					
Peut être coupé ou écrasé					
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires					
urticaire-rash-dommages hépatiques					
LACTATE RINGER inj. 1000 mL soluté			IVperf		
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx			agents suppléance		
en perfusion IV continue					
TVO (30 mL/h)					
Servi par le magasin					
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires					
GRANISETRON 1 mg/1 mL sol. inj. fiole (Kytril)			IV		
OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx			anti-émétiques		
1 MG = 1 mL IV pousse-seringue					
pour 1 dose en salle d'opération					
Compléter ad 20 mL avec NaCl 0,9% et administrer en 15 min.					
OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires					

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

Hôpital Anna-Laberge

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valide du		à 00:00 au	à 23:59 ***	(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant		Voie d'adm.				
ONDANSETRON 4 mg/2 mL sol. inj. (Zofran) OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx 4 MG = 2 mL via minisac pour 1 dose en salle d'opération Dans 50 mL de D5% ou NaCl 0,9% en 15 min OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires nausées et vomissements-constipation-céphalées-sympt. extra-pyramidaux		anti-émétiques Commun IV				
DEXAMETHASONE 4 mg/mL sol.inj. fiole 5 mL (Decadron) OIPI-721 Pré-op prothèse PUC, PTG et PTH-Rx 10 MG = 2.5 mL IV direct pour 1 dose après l'induction Injecter lentement à raison de 4 mg/min Multidose Conserver restes OIPI-721 Prothèse PUC, PTG et PTH- Rx préopératoires nausées et vomissements-faiblesse musculaire-retard cicatrisat. plaie-déséquil. électrolytiq...		corticostéroïdes IV				
Init.: _____ Heure: _____	Apposer l'étiquette de la pharmacie et vos initiales OU écrire la nouvelle ordonnance et vos initiales.					

FADM vérifiée par : _____ Le : _____

Signature(s)	Init(s)	Signature(s)	Init(s)	Signature(s)	Init(s)

(R) Refus (EX) Examen (SO) Salle d'opération (AA) Auto-administration (AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.

⚠ Précautions lors de la manipulation ⚠ Précautions grossesse et allaitement ⚠ Cytotoxique ⚠ HR Haut risque