

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***	(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant PHENOBARBITAL 120 mg/mL 1mL inj OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j barbituriques MG = _____ mL IV via minisac pour 1 dose Diluer pour concentration de 10 mg/mL dans NaCl 0,9% 1000 mg et moins : administrer en 20 minutes plus de 1000 mg : administrer en 30 minutes DVI requise / Narco sous clé. Max : 2000 mg OIPI-804 Status epilepticus chez l'enfant / 2e intention nausée, vomissement, diarrée, agitation-somnolence-			Voie d'adm. IV DVI _____	DVI _____	DVI _____
PHENYTOINE 250 mg/5 mL sol.inj (Dilantin) OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j Hydantoïnes MG = _____ mL IV ou intra-osseux pour 1 dose Diluer pour concentration de 10 mg/mL dans NaCl 0,9% Dose 1000 mg et moins : en 20 min; sup à 1000 mg : en 30 min Utiliser tubulure avec filtre 0,22 micron / Rincer tubulure avec NS avant et après / Manipuler avec précautions OIPI-804 Status epilepticus chez l'enfant / 2e intention nausées et vomissements-hyperplasie gingivale-trouble d'élocution-ataxie			IV 		
levETIRAcetam 500 mg / 5 mL sol. inj. fiole (Keppra) OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j anticonvulsivants divers MG = _____ mL intraveineux pour 1 dose (Dose 60 mg/kg (max: 4500 mg)) Diluer 1:1 NaCl 0,9% dans seringue et administrer en 5 min Si persistance des convulsions malgré la benzodiazépine OIPI-804 Status epilepticus chez l'enfant / 2e intention dépression-somnolence-étourdissement-asthénie			IV		
LACOSAMIDE 10 mg/mL sol.inj. fiole 20 mL (Vimpat) OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j anticonvulsivants divers MG = _____ mL pour 1 dose Administrer en 15 minutes NON redilué Dose de 10 mg/kg (max: 400 mg) Si persistance ou reprise des convulsions OIPI-804 Status epilepticus chez l'enfant / 2e intention fibrillation auriculaire-nausées-étourdissement-diplopie			IV		

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

OIPI-804 Status epilepticus - enfant de plus de 28j

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***	(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
MIDAZOLAM 5 mg/ml sol.inj. 2 mL fiole (Versed) OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j benzodiazépines MG = _____ mL STAT Si pas d'accès veineux disponible Narco sous clé / Si non reçu en intranasal Jeter toute portion restante. Max : 10 mg OIPI-804 Status epilepticus chez l'enfant / 1re intention confusion-somnolence-étourdissement-			IM		
MIDAZOLAM 5 mg/ml sol.inj. 2 mL fiole (Versed) OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j benzodiazépines MG = _____ mL STAT Si pas d'accès veineux disponible Narco sous clé / Si non reçu IM. Max : 10 mg Utiliser le dispositif MAD300 pour inhalation OIPI-804 Status epilepticus chez l'enfant / 1re intention confusion-somnolence-étourdissement-			NASAL		
LORAZEPAM 4 mg/mL sol. inj. (Ativan) OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j benzodiazépines MG = _____ mL IV direct STAT Rediluer ad 4 mL avec NaCl 0,9% et administrer en 2 minutes Réfrigérer / DVI requise Narco sous clé. Max 4 mg OIPI-804 Status epilepticus chez l'enfant / 1re intention confusion-somnolence-étourdissement-			IV	DVI _____	DVI _____
MIDAZOLAM 5 mg/ml sol.inj. 1 mL fiole (Versed) OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j benzodiazépines MG = _____ mL IV STAT Compléter jusqu'à 5 mL avec NaCl 0,9% administrer en 2 min DVI requise. Max : 5 mg Narco sous clé / Jeter toute portion restante OIPI-804 Status epilepticus chez l'enfant / 1re intention confusion-somnolence-étourdissement-			IV	DVI _____	DVI _____

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.

 Précautions lors de la manipulation

 Précautions grossesse et allaitement

 Cytotoxique

 Haut risque

OIPI-804 Status epilepticus - enfant de plus de 28j

Nom, Prénom:

Chambre:

Allergie(s):

Naissance:

Dossier:

Intolérance(s):

RAMQ:

Sexe:

Remarques:

Créat.:

Poids (kg):

CI creat. :

Taille (cm):

*** Valide du	à 00:00 au	à 23:59 ***	(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant LORAZEPAM 4 mg/mL sol. inj. (Ativan) OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j benzodiazépines MG = _____ mL IV ou intra-osseux pour 1 dose si persist./reprise convulsions 5 min post benzo Rediluer la dose ad 4 mL avec NaCl 0,9% Administrer en 30 à 60 secondes Peut être administré IV ou Intra-osseux. Max : 4 mg Narco sous clé /Réfrigérer/ DVI requise OIPI-804 Status epilepticus chez l'enfant / 1re intention confusion-somnolence-étourdissement-			Voie d'adm. IV DVI _____	DVI _____	DVI _____
MIDAZOLAM 5 mg/ml sol.inj. 1 mL fiole (Versed) OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j benzodiazépines MG = _____ mL IV ou intra-osseux pour 1 dose si persist./reprise convulsions 5 min post benzo Compléter jusqu'à 5 mL avec NaCl 0,9% Administrer en 30 à 60 sec. DVI requise. Max : 5 mg Narco sous clé/ Jeter toute portion restante OIPI-804 Status epilepticus chez l'enfant / 1re intention confusion-somnolence-étourdissement-			IV DVI _____	DVI _____	DVI _____
SODIUM CHLORURE 0,9 % inj. 1000 mL soluté (NaCl) OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j agents suppléance En perfusion IV continue Max : 100 mL/h Servi par le magasin OIPI-804 Status epilepticus chez l'enfant irritation locale-sensation de brûlure			IVperf		
DEXTROSE 10% 250 mL sol inj OIPI-804 Status epilepticus-enfant de plus de 28j agents suppléance ML IV direct pour 1 dose si glycémie inférieure à 2,6 mmol/L Administrer en 30 minutes Volume max : 250 mL Servi par le magasin			IV		

(R) Refus

(EX) Examen

(SO) Salle d'opération

(AA) Auto-administration

(AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.



Précautions lors de la manipulation



Précautions grossesse et allaitement



Cytotoxique



Haut risque

OIPI-804 Status epilepticus - enfant de plus de 28j

Nom, Prénom:

Allergie(s):

Intolérance(s):

Remarques:

Chambre:

Dossier:

Sexe:

Poids (kg):

Taille (cm):

Naissance:

RAMQ:

Créat.:

CI creat. :

*** Valide du		à 00:00 au	à 23:59 ***	(00:00-07:29)	(07:30-15:29)	(15:30-23:59)
Nom générique du médicament/nom commercial courant		Voie d'adm.				
Init.: _____ Heure: _____	Apposer l'étiquette de la pharmacie et vos initiales OU écrire la nouvelle ordonnance et vos initiales.					
Init.: _____ Heure: _____	Apposer l'étiquette de la pharmacie et vos initiales OU écrire la nouvelle ordonnance et vos initiales.					

FADM vérifiée par : _____ Le : _____

Signature(s)	Init(s)	Signature(s)	Init(s)	Signature(s)	Init(s)

(R) Refus (EX) Examen (SO) Salle d'opération (AA) Auto-administration (AR) Autre raison (détailler)

Apposer les initiales dans la case au moment de l'administration.

 Précautions lors de la manipulation  Précautions grossesse et allaitement  Cytotoxique  Haut risque