

Installation : _____

FEUILLET D'INFORMATION DESTINÉ À L'USAGER FER INTRAVEINEUX

Vos doses de fer intraveineux seront administrées au CLSC le plus près de chez vous.

- ☞ Une télécopie (FAX) de votre ordonnance sera envoyée à votre CLSC.
- ☞ Vous devez vous procurer le fer intraveineux à votre pharmacie au moins 48 heures avant la date prévue de votre rendez-vous. Conserver à la maison le fer intraveineux selon les recommandations du pharmacien jusqu'au rendez-vous au CLSC.
- ☞ Vous devez communiquer avec la secrétaire de votre CLSC pour tout changement relatif à votre rendez-vous concernant votre traitement de fer Intraveineux.
- ☞ Vous devez apporter le fer acheté à votre pharmacie lors de votre rendez-vous au CLSC.
- ☞ Vous devez prévoir apporter un jus ou de l'eau lors du rendez-vous.
- ☞ À la fin du traitement, après une **période d'observation de 30 minutes** vous pourrez retourner à votre domicile.
- ☞ Il n'est pas obligatoire d'être accompagné.
- ☞ Vous ne pourrez pas donner de sang jusqu'à ce que votre réserve de fer soit revenue à la normale et avec l'avis de votre médecin

Interactions avec les autres médicaments

Bien que le fer intraveineux puisse être utilisé avec la majorité des autres médicaments sans causer de problème, il est **IMPORTANT DE CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN** avant de prendre tout nouveau médicament prescrit ou en vente libre ainsi que tout produit de santé naturel.

COORDONNÉES DES CLSC		
CLSC	Télécopieur	Téléphone
CLSC de Salaberry-de-Valleyfield	450-371-0496	450-371-0143
CLSC Beauharnois	450-429-1119	450-429-6455
CLSC Huntingdon	450-264-6801	450-829-2321
CLSC de St-Chrysostome	450-826-4239	450-826-3161
CLSC de Vaudreuil-Dorion, Rigaud et St-Polycarpe	450-455-6192	450-455-6171
CLSC Châteauguay	450-699-3508	450-699-3333
CLSC Napierville	450-454-2909	450-245-3336
CLSC de St-Rémi	450-454-2909	450-454-4671
CLSC Katéri	450-659-1642	450-659-7661

Le FER intraveineux est un médicament sécuritaire et bien toléré généralement. Par contre, des effets indésirables peuvent survenir et sont habituellement temporaires (1 à 3 jours).

Effets indésirables pendant le traitement et jusqu'à 30 minutes après le traitement Aviser votre infirmière si...	Effets indésirables retardés (24 à 72 heures après l'administration)
• Douleur ou enflure au site d'injection • Oppression à la poitrine ou douleur au dos • Douleur abdominale : Nausées/Vomissements/Diarrhée • Étourdissements • Rougeurs sur la peau • Difficulté à respirer • Enflure de la langue	• Goût métallique dans la bouche • Douleur au site d'injection • Douleur abdominale : Nausées/Vomissements/Diarrhée • Céphalée (maux de tête) • Bouffées de chaleur • Étourdissements • Diminution de la tension artérielle • Crampes musculaires <u>Symptômes similaires à la grippe</u> • Myalgie (douleur musculaire). • Fièvre supérieure à 38,5°C. • Céphalée (maux de tête). Ces symptômes peuvent être traités avec de l'acétaminophène (Tylenol) à moins d'être une contre-indication dans votre état de santé. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'Advil par exemple sont à éviter, car ils peuvent aggraver les symptômes.
Appeler le 811 ou consulter votre médecin si les symptômes ne s'estompent pas après 72 heures	

Des réactions allergiques sévères tardives peuvent survenir très rarement

Dans les 24 prochaines heures, **appeler le 911** si vous présentez des difficultés respiratoires ou une enflure de la langue. Informer un membre de l'équipe (médecin / infirmière) si vous présentez une éruption cutanée.

Suivis requis

Vous devrez faire des prises de sang **après** votre ou vos doses de FER intraveineux selon l'ordonnance de votre médecin.