



Installation : _____

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
aaaa-mm-jj

NAM : _____ Exp. _____
aaaa-mm

Nom, Prénom de la mère : _____

RÉSULTATS BILIRUBINÉMIE TRANSCUTANÉE SOINS INFIRMIERS NOUVEAU-NÉ DÉPISTÉ AU CLSC

Cette analyse est un résultat d'examen de biologie médicale délocalisée (EBMD).

Nombre de semaines	☐ 37 ^{6/7} semaines et moins	☐ 38 semaines et plus
Facteurs de risque		
☐ Coombs direct positif	☐ Tachypnée (respiration supérieure à 60/min) de façon soutenue au-delà de 6h de vie	
☐ ph du cordon inférieur à 7,00	☐ Nouveau-né mis sous antibiotiques en post-natal	
	☐ Réanimation avec une ventilation par pression positive continue (PPC) ou par pression positive (VPP) de 10 minutes ou plus, avec ou sans oxygène.	
Si information manquante (ex : groupe sanguin), utiliser la courbe de nouveau-né à risque élevé ou à risque modéré selon l'âge gestationnel.		

Évaluation du niveau de risque (coché) par l'infirmière : Signature _____

☐ RISQUE FAIBLE : NOUVEAU-NÉ DE 38 SEMAINES ET PLUS SANS FACTEUR DE RISQUE

Âge (h)	Résultat (μmol/L)	Contrôle dans 24 h requis	Dosage bilirubine sérique requis	Date aaaa / mm / jj	Heure hh:mm	Signature et titre	N° employé
36-41		160-179	≥180	aaaa/mm/jj	hh:mm		
42-47		170-199	≥ 200	aaaa/mm/jj	hh:mm		
48-59		190-209	≥ 210	aaaa/mm/jj	hh:mm		
60-71		210-229	≥ 230	aaaa/mm/jj	hh:mm		
72-83		230-249	≥ 250	aaaa/mm/jj	hh:mm		
84-95		250-269	≥ 270	aaaa/mm/jj	hh:mm		
96-107		270-289	≥ 290	aaaa/mm/jj	hh:mm		
> 108		290-309	≥ 310	aaaa/mm/jj	hh:mm		

☐ RISQUE MODÉRÉ : NOUVEAU-NÉ DE 38 SEMAINES ET PLUS AVEC UN FACTEUR DE RISQUE OU PLUS NOUVEAU-NÉ DE 35 À 37^{6/7} SEMAINES SANS FACTEUR DE RISQUE

Âge (h)	Résultat (μmol/L)	Contrôle dans 24 h requis	Dosage bilirubine sérique requis	Date aaaa / mm / jj	Heure hh:mm	Signature et titre	N° employé
36-41		125-149	≥150	aaaa/mm/jj	hh:mm		
42-47		135-159	≥160	aaaa/mm/jj	hh:mm		
48-59		150-169	≥170	aaaa/mm/jj	hh:mm		
60-71		180-199	≥200	aaaa/mm/jj	hh:mm		
72-83		195-214	≥215	aaaa/mm/jj	hh:mm		
84-95		210-229	≥230	aaaa/mm/jj	hh:mm		
96-107		230-249	≥250	aaaa/mm/jj	hh:mm		
> 108		240-259	≥260	aaaa/mm/jj	hh:mm		

☐ RISQUE ÉLEVÉ : NOUVEAU-NÉ DE 35 À 37^{6/7} SEMAINES AVEC UN FACTEUR DE RISQUE OU PLUS

Âge (h)	Résultat (μmol/L)	Contrôle dans 24 h requis	Dosage bilirubine sérique requis	Date aaaa / mm / jj	Heure hh:mm	Signature et titre	N° employé
42-47		90-129	≥130	aaaa/mm/jj	hh:mm		
48-59		120-139	≥140	aaaa/mm/jj	hh:mm		
60-71		150-169	≥170	aaaa/mm/jj	hh:mm		
72-83		160-179	≥180	aaaa/mm/jj	hh:mm		
84-95		170-189	≥190	aaaa/mm/jj	hh:mm		
96-107		180-199	≥200	aaaa/mm/jj	hh:mm		
> 108		195-204	≥205	aaaa/mm/jj	hh:mm		