

20 MARS 2020

Réponse
rapide

COVID-19 et Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Une production de l'Institut
national d'excellence en santé
et en services sociaux (INESSS)

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2020

Bibliothèque et Archives Canada, 2020

ISSN 1915-3104 INESSS (PDF) 978-2-550-86375-5 (PDF)

© Gouvernement du Québec, 2020

La reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée à condition que la source soit mentionnée.

Pour citer ce document : Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). COVID-19 et Anti-inflammatoires non stéroïdiens. Québec, Qc : INESSS; 2020. 7 p.

L'Institut remercie les membres de son personnel qui ont contribué à l'élaboration du présent document.

COVID-19 et Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Le présent document ainsi que les constats et prises de position qu'il énonce ont été rédigés en réponse à une interpellation du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le contexte de l'urgence sanitaire liée à la maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec. Cette position est basée sur une recension sommaire de la documentation scientifique par des professionnels en évaluation et pharmaciens de l'INESSS. Par ailleurs, son contenu repose sur les connaissances disponibles au moment de sa rédaction. Dans les circonstances d'une telle urgence de santé publique, l'INESSS reste à l'affût de toutes nouvelles données susceptibles de lui faire modifier son avis.

POSITION DE L'INESSS

En attendant de disposer de davantage de données cliniques, l'INESSS recommande de suivre les principes de prudence suivants:

- Les patients avec un diagnostic confirmé ou présentant un syndrome infectieux même mineur s'apparentant à la COVID-19 devraient privilégier la prise d'acétaminophène;
- L'acétaminophène doit être utilisé aux doses recommandées en fonction du contexte clinique (enfants, personnes âgées, personnes ayant des ajustements de doses spécifiques selon leur condition).
- L'utilisation d'ibuprofène ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens chez ces patients ne devrait être envisagée qu'en cas d'intolérance ou d'allergie à l'acétaminophène ou sur recommandation explicite d'un professionnel de la santé.
- Les patients prenant de l'aspirine ou un AINS de façon chronique pour d'autres indications devraient poursuivre leur traitement. S'ils présentent des symptômes de la COVID-19, ils doivent consulter leur professionnel de la santé;

Il n'existe à ce jour aucune étude clinique démontrant que l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) augmente le risque de développer une forme grave de la maladie à coronavirus qui sévit actuellement (COVID-19).

Complications infectieuses et respiratoires

L'interprétation de rapports de cas d'aggravation des symptômes de la COVID-19 chez des patients ayant reçu des AINS doit être réalisée avec prudence puisque ces derniers pourraient avoir été utilisés au début de l'apparition de complications de l'infection. Le recours à ces molécules pourrait également être le reflet d'une présentation clinique plus sévère.

Il existe toutefois une accumulation de données indiquant que l'utilisation d'ibuprofène au cours d'une infection des voies respiratoires pourrait s'accompagner d'une augmentation du risque d'aggravation des symptômes et de survenue de complications infectieuses (Basille 2017, LeBourgeois 2016, Voiriot 2011, Mikaeloff Y 2008, Souyri 2008, Krenke 2018, Kotsiou 2017). Il n'est pas clair si ces complications résultent de l'altération du recrutement des polynucléaires neutrophiles au site de l'infection par les AINS et par extension d'un retard de la clairance du pathogène, ou d'un effet direct de cette classe de médicaments sur sa prolifération.

Complications cardiovasculaires (Wen 2017 et 2018)

Des études observationnelles conduites au Royaume-Uni ont conclu que l'utilisation d'AINS au cours d'infections respiratoires était associée à un risque 3,4 fois plus important de subir un infarctus aigu du myocarde. Ces infections étaient causées par une souche de coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV) dont le coronavirus responsable de la COVID-19 (SRAS-CoV-2) partage une proportion importante du génome.

Bonne pratique clinique

Considérant les données évoquant la possibilité d'effets délétères associés à l'utilisation d'AINS dans le contexte d'une maladie à coronavirus (COVID-19) et l'atteinte rénale pouvant accompagner la maladie, il est jugé prudent de ne pas consommer d'AINS pour la prise en charge des symptômes de l'infection.

POSITION DE L'INESSS

En attendant de disposer de davantage de données cliniques, l'INESSS recommande de suivre les principes de prudence suivants:

- Les patients avec un diagnostic confirmé ou présentant un syndrome infectieux même mineur s'apparentant à la COVID-19 devraient privilégier la prise d'acétaminophène;
- L'acétaminophène doit être utilisé aux doses recommandées en fonction du contexte clinique (enfants, personnes âgées, personnes ayant des ajustements de doses spécifiques selon leur condition).
- L'utilisation d'ibuprofène ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens chez ces patients ne devrait être envisagée qu'en cas d'intolérance ou d'allergie à l'acétaminophène ou sur recommandation explicite d'un professionnel de la santé.
- Les patients prenant de l'aspirine ou un AINS de façon chronique pour d'autres indications devraient poursuivre leur traitement. S'ils présentent des symptômes de la COVID-19, ils doivent consulter leur professionnel de la santé;

RÉFÉRENCES

- Basille D, Plouvier N, Trouve C, et coll. Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs may Worsen the Course of Community-Acquired Pneumonia: A Cohort Study. *Lung*. 2017;195(2):201-8.
- Le Bourgeois M, Ferroni A, Leruez-Ville M, Varon E, Thumerelle C, Bremont F, et al. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug without Antibiotics for Acute Viral Infection Increases the Empyema Risk in Children: A Matched Case-Control Study. *The Journal of pediatrics*. 2016;175:47-53.e3.
- Voiriot G, Dury S, Parrot A, et coll. Nonsteroidal antiinflammatory drugs may affect the presentation and course of community-acquired pneumonia. *Chest*. 2011;139(2):387-94.
- Mikaeloff Y, Kezouh A, Suissa S. Nonsteroidal anti-inflammatory drug use and the risk of severe skin and soft tissue complications in patients with varicella or zoster disease. *Br J Clin Pharmacol*. 2008;65(2):203-9.
- Souyri C, Olivier P, Grolleau S, Lapeyre-Mestre M. Severe necrotizing soft-tissue infections and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. *Clinical and experimental dermatology*. 2008;33(3):249-55.
- Krenke K, Krawiec M, Kraj G, Peradzynska J, Krauze A, Kulus M. Risk factors for local complications in children with community-acquired pneumonia. *The clinical respiratory journal*. 2018;12(1):253-61.
- Kotsiou OS, Zarogiannis SG, Gourgoulisanis KI. Prehospital NSAIDs use prolong hospitalization in patients with pleuro-pulmonary infection. *Respir Med*. 2017;123:28-33.
- Francois P, Desrumaux A, Cans C, Pin I, Pavese P, Labarere J. Prevalence and risk factors of suppurative complications in children with pneumonia. *Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992)*. 2010;99(6):861-6.
- Messika J, Sztrymf B, Bertrand F, Billard-Pomares T, Barnaud G, Branger C, et al. Risks of nonsteroidal antiinflammatory drugs in undiagnosed intensive care unit pneumococcal pneumonia: younger and more severely affected patients. *Journal of critical care*. 2014;29(5):733-8.
- Elemraid MA, Thomas MF, Blain AP, Rushton SP, Spencer DA, Gennery AR, et al. Risk factors for the development of pleural empyema in children. *Pediatr Pulmonol*. 2015;50(7):721-6.
- ANSM : Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et complications infectieuses graves - Point d'Information. Disponible à : <https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-et-complications-infectieuses-graves-Point-d-Information>
- Wen YC, Hsiao FY, Lin ZF, et coll. Risk of stroke associated with use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs during acute respiratory infection episode. *Pharmacoepidemiology and drug safety*. 2018.

Wen YC, Hsiao FY, Chan KA, et coll. Acute Respiratory Infection and Use of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs on Risk of Acute Myocardial Infarction: A Nationwide Case-Crossover Study. *J Infect Dis.* 2017;215(4):503-9.

*Institut national
d'excellence en santé
et en services sociaux*

Québec



Siège social

2535, boulevard Laurier, 5^e étage
Québec (Québec) G1V 4M3
418 643-1339

Bureau de Montréal

2021, avenue Union, 12^e étage, bureau 1200
Montréal (Québec) H3A 2S9
514 873-2563
inesss.qc.ca

