

Info-Écllosion

Date : 2026-09-02

Installation concernée : Hôpital Barrie Mémorial

Expéditeur/Expéditrice : Laurence Bellerose-Roy, Conseillère PCI secteur HSL

UNITÉS	Urgence	3 ^{ème} étage
Alerte/Vigie		Vigie ERV 1 usager
Écllosion		
Isolement & dépistage lors de transfert		N/A
Dépistage admission/congé		Selon le questionnaire d'admission BMR (CLI-60315)
Admission		Appliquer les précautions additionnelles de type contact B et effectuer les dépistages SARM-ERV-EPC pour tous les usagers en provenance d'un centre hospitalier. Appliquer les précautions additionnelles contact C et effectuer les dépistages SARM-ERV-EPC et le C. auris pour tous les usagers qui ont été hospitalisé hors Québec. Appliquer les précautions additionnelles de type contact B et effectuer les dépistages SARM-ERV pour tous les usagers en provenance d'un CHSLD public. Les dépistages SARS-CoV-2 et des précautions additionnelles aérienne-contact-protection oculaire sont requis pour les usagers symptomatiques admis sur l'unité de soins.
Dépistage hebdomadaire		Dépistage SARM-ERV-EPC chaque mardi
Hygiène et Salubrité	Régulier	Régulier
Hygiène des mains		Hygiène des mains pour tout le personnel selon les 4 moments Favoriser l'hygiène des mains des usagers avant de prendre la médication, avant les repas et après avoir été à la toilette. <u>Pour détruire les micro-organismes : vous devez frictionner vos mains pendant plus de 15 secondes</u>
ÉPI TdeS		Selon l'évaluation du risque au point de service et les précautions additionnelles en place
Équipements dédiés		Pour les usagers en précautions additionnelles
Équipements de soins non dédiés		Nettoyer/désinfecter les équipements de soins (glucomètre, stéthoscope, saturomètre, chariot, etc..) avec des lingettes désinfectantes selon les procédures établies dans l'installation et l'agent pathogène en cause. Attention : le chlore stabilisé est requis pour les pastilles C. Appareil à pression automatique pour la prise de tension artérielle : À utiliser <u>uniquement</u> si usager est hémodynamiquement instable ou en post-op immédiat
Toilette complète		Savon ou lingettes CHG pour usager connu porteur BMR
Autres:		Recommandation – Port du masque de procédure pour les soins aux usagers avec critères de vulnérabilité : https://intranet.ciassmo.rtss.qc.ca/fr/publications-et-documents/note-de-service-recommandations-usagers-avec-criteres-de-vulnerabilite
Légende : BMR : Bactérie multirésistante EPC : Entérobactérie productrice de carbapénémases CHG : Chlorhexidine ÉPI : Équipement de protection individuelle ERV : Entérocoques résistant vancomycine SARM : Staphylococcus aureus résistant méthicilline		
Niveaux d'interventions : Niveau d'intervention Vert : Écllosion qui implique une incidence légèrement à la hausse Niveau d'intervention Jaune : Écllosion qui implique une incidence à la hausse avec apparition constante de nouveaux cas Niveau d'intervention Rouge : Écllosion majeure, implique une apparition quotidienne et constante de nouveaux cas		

