

Info-Écllosion

Date : 2026-10-02

Installation concernée : Hôpital du Suroît

Expéditeur/Expéditrice : Vanessa Legault, Conseillère volet PCI – Secteur Suroît et VS

Nouvelles informations en rouge et surlignées

UNITÉS	Urgence	Soins intensifs	1C	4A	7A	8A	2B	3B	Santé mentale
Spécificité(s)	UHB		Complexe médical	Gériatrie active	Chirurgie	Cohorte SARM	NSA / Médecine	Cohortes ERV et EPC	
ALERTE / VIGIE								Vigie EPC (oxa-48) 2026-09-13 Usager : 1	
ÉCLOSION									
Isolement & dépistage lors de transfert									
Admission	Tous les usagers en provenance d'un centre hospitalier doivent être en précautions additionnelles (P.A.) contact B avec un dépistage SARM-ERV-EPC. Si l'usager a été hospitalisé hors province, mettre P.A. contact C et faire SARM-ERV-EPC-C.AURIS. Les admissions en provenance des CHSLD doivent être en P.A. contact B et faire SARM-ERV.								
Dépistage hebdo-madaire	Selon le questionnaire d'admission	SARMx-EPC : Dépistage pour TOUS SAMEDI	SARMx : si prise d'antibio PO et/ou IV ≥ 3 jours. Dépistage JEUDI	SARMx : si prise d'antibio PO et/ou IV ≥ 3 jours. Dépistage VENDREDI	SARMx : si prise d'antibio PO et/ou IV ≥ 3 jours. Dépistage MERCREDI	SARMx : Dépistage pour TOUS SAMEDI	SARMx : si prise d'antibio PO et/ou IV ≥ 3 jours. Dépistage MERCREDI	SARMx-EPC : Dépistage pour TOUS SAMEDI Dépistages : 4-11 oct	
Hygiène des mains	Hygiène des mains pour tout le personnel selon les 4 moments Favoriser l'hygiène des mains des usagers avant les repas, avant de prendre la médication et après avoir été à la toilette. Attention : vous devez frictionner vos mains pendant plus de 15 secondes								
Équipements dédiés	Le nettoyage et désinfection des appareils doit se faire entre chaque usager différent après utilisation <u>Attention rappels spécifiques pour ERV et EPC : éviter la rétro contamination des lavabos, donc ne pas déposer de débarbouillettes souillées de selles dans les lavabos, ne pas jeter de solutés dans les lavabos et ne pas prendre de l'eau pour boire dans les postes d'hygiène des mains</u>								
Équipement non dédiés	Nettoyer/désinfecter les petits équipements (glucomètre, stéthoscope, saturomètre, chariot, etc.) avec des lingettes désinfectantes selon les procédures établies dans l'installation et l'agent pathogène en cause. Attention lors d'une affiche de précautions additionnelles C : lingette de Clorox chlore pour les petits équipements de soins								
Équipement Protection individuelle	Selon l'évaluation du risque au point de service et les précautions additionnelles								
Hygiène Salubrité						H Touch		H Touch	
Toilette complète		Lingette CHG				Lingette CHG		Lingette CHG	
Dépistage Covid admission	Pour un usager asymptomatique, il n'est pas requis d'attendre un résultat de dépistage avant de l'admettre à l'unité. De plus, les dépistages et des précautions additionnelles (P.A. Aérienne-contact-protection oculaire) sont requis pour les usagers symptomatiques.								
Autres	Cohorte EPC/ERV au 3B : chambre privée et les jumelages sont possibles seulement avec l'accord du service PCI Cohorte SARM au 8e étage bloc A : chambre privée et les jumelages sont possibles seulement avec l'accord du service PCI Admission Covid-19 sur tous les étages : maximum 2 usagers Covid-19 positifs par chambre, <u>éviter les admissions Covid+ au 2B.</u>								

Légende :
DACD : Diarrhées associées au clostridium difficile
ERV : Entérocoque résistant à la vancomycine
EPC : Entérobactérie productrice de carbapénémase
SARM : Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
CHC : Chlorhexidine
H/T : High Touch
P.A. : Précautions additionnelles
BMR : Bactérie multirésistante

ATTENTION

Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans les unités de soins en écllosion de virus respiratoire, auprès des usagers vulnérables (ex. : usagés immunosupprimées, greffées ou issues de la clientèle hémato-oncologique), ainsi que chaque fois que les précautions additionnelles ou l'étiquette respiratoire l'exigent.