



Informations importantes – Contraception après une chirurgie

Lors de votre intervention chirurgicale du _____, vous avez reçu un ou des médicaments pouvant réduire temporairement l'efficacité de certaines méthodes contraceptives hormonales.

Les médicaments concernés sont :

- Sugammadex (Bridion®)
- Aprépitant (Emend®)

Il est important de lire attentivement cette information si vous utilisez une méthode de contraception hormonale.

☐ **Sugammadex (Bridion®)**

Le sugammadex est un médicament utilisé lors d'une anesthésie générale. Il peut diminuer l'efficacité de votre contraception hormonale pendant une période allant jusqu'à 7 jours après l'intervention.

- ➔ Vous devez utiliser une méthode contraceptive supplémentaire pendant 7 jours.
- ➔ Continuez à prendre votre contraceptif habituel comme prévu.

☐ **Aprépitant (Emend®)**

L'aprépitant est un médicament utilisé pour prévenir les nausées et vomissements. Il peut réduire l'efficacité des contraceptifs hormonaux pendant une période allant jusqu'à 28 jours après l'intervention.

- ➔ Vous devez utiliser une méthode contraceptive supplémentaire pendant 28 jours.
- ➔ Continuez à prendre votre contraceptif habituel comme prévu.

Méthodes contraceptives pouvant être affectées

- Pilule contraceptive.
- Injection contraceptive.
- Implant contraceptif.
- Timbre contraceptif.
- Anneau vaginal.
- Stérilet hormonal.

Méthodes contraceptives alternatives recommandées

Pendant la période indiquée, utilisez une méthode non hormonale, par exemple :

- Condom masculin ou féminin.
- Diaphragme.
- Cape cervicale.
- Éponge contraceptive.
- Abstinence.

Besoin de plus d'information ?

Si vous avez des questions, consultez votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien.

