

DESTINATAIRES : À tout le personnel de la pharmacie, au personnel infirmier et gestionnaire d'unités de l'Hôpital Anna-Laberge

EXPÉDITEUR : Sandra Chapados, adjointe au chef du département de pharmacie

DATE : 2016-02-17

OBJET : Informatisation des échelles « faible dose et dose intermédiaire » pour les insulines sous-cutanée (régulière, Aspart et Lispro)

A partir du 18 février, les échelles « faible dose et dose intermédiaire » des insulines sous-cutanée régulière (Humulin R), Aspart (Novorapid) et Lispro (Humalog) contenues dans l'ordonnance pré-imprimée ORD-1-insuline_échelle-sc (2014-06-18) seront informatisées et apparaîtront sur la feuille d'administration des médicaments (F.A.D.M). L'informatisation des échelles est applicable uniquement pour ces échelles standards. Les échelles de dose spécifique ne seront pas informatisées.

PROFIL PHARMACOLOGIQUE (F.A.D.M.)

CSSS Jardins Roussillon

Nom, Prénom: **TEST TEST**

Chambre: **OBS-8**

Allergie(s):

Médecin: MÉDECIN INDÉTERMINÉ
Naissance: 2015-08-17 (6 mois)
Âge: 6 mois

Dossier: **000000**

Poids (kg):
Taille (cm):

Remarques:

*** Valide du Mercredi 17 Février 2016 à 14:00 au Jeudi 18 Février 2016 à 13:59 ***	
Nom générique du médicament/présentation (Synonyme)	Voie d'adm.
INSULINE HUM REG 100U/mL 3mL kwikpen (Humulin R Kwikpen)	SC
dose ajustée SC	
échelle FAIBLE DOSE 4 fois/j(1/2dose HS)	
4-7.4: 0 UNITÉ, 7.5-10: 2 UNITÉS, 10.1-13.4: 4 UNITÉS	
13.5-16.4: 6 UNITÉS, 16.5-19.4: 8 UNITÉS, 19.5-22: 10 UNITÉS	
> 22.1: 12 UNITÉS	
VERIFIÉ PAR:	
rougeurs-lipodystrophie-picotement-hypoglycémie	
Début: 2016-02-16 (08:52) Fin: 2018-11-11 (23:59) Dern date service: 2016-02-16	

Exemple sur
FADM

Ordonnance pré-imprimée
**Administration
d'insuline sous-cutanée
selon échelle glycémique**

Allergie: _____

Note: L'échelle glycémique est une mesure temporaire qui peut être utilisée:

- Comme supplément à la médication usuelle (insuline à longue action ou hypoglycémisants oraux) chez le patient avec hyperglycémie.
- Pour les patients diabétiques dont les besoins en insuline sont inconnus.

Insuline:

- ☐ Insuline Régulière (Humulin R)
- ☐ Insuline Aspart (NovoRapid®)
- ☐ Insuline Lispro (Humalog®)

Posologie:

- ☐ Faible dose: pour patient de faible poids, patient âgé ou début de nutrition parentérale totale
- ☐ Dose intermédiaire: pour la plupart des patients
- ☐ Dose spécifique: pour patients avec infection ou sous corticostéroïdes à hautes doses

Glycémie (mmol/l)	Faible dose	Dose intermédiaire	Dose spécifique
< 4	Traiter hypoglycémie, si persiste après correction aviser médecin	Traiter hypoglycémie, si persiste après correction aviser médecin	Traiter hypoglycémie, si persiste après correction aviser médecin
4 - 7.4	0 unité	0 unité	0 unité
7.5 - 10	2 unités	4 unités	unités
10.1 - 13.4	4 unités	8 unités	unités
13.5 - 16.4	6 unités	10 unités	unités
16.5 - 19.4	8 unités	12 unités	unités
19.5 - 22	10 unités	16 unités	unités
> 22.1	12 unités	20 unités	unités

Glycémies capillaires ☐ QID ☐ TID ac

Insuline: ☐ QID ☐ TID ac ☐ ½ dose HS ☐ ½ dose si NPO

signature du médecin _____ date/heure: _____

signature du pharmacien: _____

ORD-1 - Insuline_échelle-sc(2014-06-18).doc

Merci de votre précieuse collaboration

Sandra Chapados

Sandra Chapados
Adjointe au chef du département de pharmacie
CISSS Montérégie-Ouest
Hôpital Anna-Laberge