



ISOLEMENT PARTICULIER par SYNDRÔMES pour la CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE

Syndrome	Jume- lage	Mode d'isolement	Particularité / précautions
Cellulite péri-orbitaire	3	Gouttelettes/ Contact	Pendant 24 heures après le début d'une antibiothérapie appropriée.
Conjonctivite	3	Contact	Appliquer des précautions pour l'oeil infecté pour la durée de la maladie à moins d'avoir exclu une cause virale.
Croup (mal de gorge, stridor, toux rauque, fièvre) / bronchiolite (IVRS, respiration sifflante, difficulté respiratoire)	2A	Gouttelettes/ Contact	Durée de la maladie
Épiglottite (fièvre, dysphagie importante)	3	Gouttelettes/ Contact	Pendant 24 heures après le début d'une antibiothérapie appropriée.
Éruption pétéchiale / purpurique avec fièvre (Méningite)	1	Gouttelettes/Contact	Chambre privée. Durée des précautions, si méningocoque confirmé, jusqu'à 24 d'antibiothérapie appropriée.
Éruption vésiculaire avec fièvre (Varicelle)	1	Aérienne / Contact	Chambre privée. Chambre à pression négative. Masque N95. Durée des précautions ad lésions séchées.
Éruption maculopapuleuse avec IVRS et conjonctivite (Rougeole)	1	Aérienne (R)	Chambre privée. Chambre pression négative. Masque N95. Durée des précautions ad 4 jours après l'apparition de l'éruption.
Gastro-entérite	2B	Contact +	Durée des précautions ad 48 heures après l'arrêt des symptômes.
Hépatite (symptômes digestifs, malaises généraux, fièvre, urine foncée, selle pâle et ictère)	2B	Contact	Selon l'étiologie.
Impétigo	3	Contact si la maladie est étendue (si non couvert pas des pansements), autrement pratiques de base	Pendant 24 heures après le début d'une antibiothérapie appropriée.
Infection cutanée (furoncle, abcès, plaie infectée qui suppure ou exsudat non contenu dans un pansement)	3	Contact	Durée de la suppuration ou jusqu'à la cessation de l'écoulement.
IVRS (toux, fièvre, rhinorrhée, mal de gorge)	2A	Gouttelettes/ Contact	Durée de la maladie
Méningite	1	Gouttelettes / Contact	Chambre privée. Isolement selon l'agent en cause.
Pharyngite bactérienne / amygdalite bactérienne	3	Gouttelettes / Contact	Pendant 24 heures après le début d'une antibiothérapie appropriée.
Pneumonie d'allure bactérienne	3	Gouttelettes / Contact	Pendant 24 heures après le début d'une antibiothérapie appropriée.
Pneumonie d'allure virale	2A	Gouttelettes / Contact	Durée de la maladie.

1- Isolement strict :

- Doit obligatoirement être **seul** dans une chambre

2- Jumelage possible : Il est accepté de mettre les isollements respiratoires ensembles et les isollements dû à des diarrhées ensembles.

- 2A : maladies respiratoires
- 2B : maladies intestinales (diarrhées)

3- Isolement au lit : Il est accepté de mettre ce patient voisin d'un patient non infecté considérant que l'isollements sera temporairement mis en place.