



DSIQ – SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

MESURES PRÉVENTIVES SPÉCIFIQUES – UTILISATION DE LA CHLORHEXIDINE LIQUIDE

La solution de chlorhexidine gluconate solution 4% avec 4% v/v d'alcool isopropylique (communément nommé nettoyant à la chlorhexidine) est un nettoyant antibactérien contribuant à la diminution du nombre de microorganismes sur la peau du patient. Il est alors utilisé en remplacement d'un savon habituel, il peut être utilisé au bain, à la douche ou pour une toilette complète au lit.

La procédure suivante est à appliquer selon les recommandations du service de prévention et contrôle des infections.

EVITER L'UTILISATION SI LE PATIENT A UNE ALLERGIE A LA CHLORHEXIDINE.

Activités	Précisions
La chlorhexidine sera appliquée du cou jusqu'aux orteils, EVITER D'APPLIQUER SUR LE VISAGE, LES PARTIES GENITALES DE MEME QUE SUR LES MUQUEUSES OU UNE PEAU GERCEE.	Afin d'éviter les picotements et les irritations
Pour les bras : ○ Humecter une débarbouillette avec de l'eau tiède ; ○ Déposer environ 5¹ ml de chlorhexidine liquide sur la débarbouillette en prenant soins de le distribuer sur la surface de la débarbouillette ; ○ Utiliser une autre débarbouillette humectée d'eau afin de bien rincer le produit ; ○ Assécher la peau en tamponnant avec une nouvelle débarbouillette sèche ; Pour les jambes : ○ Effectuer les mêmes étapes en utilisant 10² ml de solution ; Pour le dos et l'abdomen : ○ Effectuer les mêmes étapes en utilisant 10 ml de solution. Pour les autres parties du corps, utiliser le savon habituel. Lors d'irritation cesser l'utilisation	
Après la toilette complète s'assurer de changer la literie et les vêtements du patient.	

Service de prévention et contrôle des infections
Août 2014

¹ 1 bouchon de la bouteille de 250 ml représente environ 5 ml.

² La quantité peut varier selon la grandeur de la zone à nettoyer.